

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия.

2 (618). **P. majus** A. Вг. 1841, Flora (Regensb.), 24: 151.

Описан из Германии.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Занг.

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер. (Гроссгейм, 1945: 118; Галушко, 1978: 216; Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ВК:** Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 129); **ВЗ:** Караб. (Карягин, 1952: 184).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия.

Trib. 2. **Beteae** Volkens

2 (93). **Hablitzia** Bieb.

1 (619). **H. tamnoides** Bieb. 1817, Мém. Soc. Nat. Moscou, 5: 24; id. 1819, Fl. Taug.-Саус. 3: 170.

Описан с Кавказа (р-н Кавказских Минеральных Вод, окр. Константиногорска [с 1830 г. — г. Пятигорск]). *Le s t o t y p u s* (Menitsky, hoc loco): «In sylvis ad thermas Constantinomontanis, inter Urticam, Aparinem et al., 1813 [Bieberstein]» (LE!).

ЦК; ВК: Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ВК:** В. Сулак. (Гроссгейм, 1945: 118; Галушко, 1978: 216); **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Капеллер, 1975: 164), Лори (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 280); **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 118; Карягин, 1952: 185).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев.-зап. Иран).

3 (94). **Beta** L.

1 (620). **B. maritima** L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 322. — *B. vulgaris* L. [var.] *perennis* L. 1753, Sp. Pl.: 222. — *B. vulgaris* var. *maritima* (L.) Моq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 15. — *B. perennis* (L.) Freyn, 1877, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 27: 414. — *B. vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang. 1882, Comp. Fl. Ital.: 592.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб.; **ВК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 130); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Рзазаде, 1952: 189); **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1945: 120; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 286).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (621). **V. macrorrhiza** Steven, 1812, Mém. Soc. Nat. Moscou, 3: 257.

Описан с Восточного Кавказа («in glareosis alpium circa Chinalug»).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Иорск.-Шек; **ЮЗ:** Севан.

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв. (Рзаде, 1952: 189); **ЮЗ:** Ерев. (Тахтаджян, Фёдоров, 1972: 87), Дар. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 286).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

3 (622). **V. lomatogona** Fisch. et C. A. Mey. 1838, in Hohen. Bull. Soc. Nat. Moscou, 3: 360.

Описан из Тальша. Турция: «Bei Tatuni, № 2328» (LE!).

ЮЗЗ: Араг; **Т:**

Указан для **ЮЗ:** Ерев. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 291; Тахтаджян, Фёдоров, 1972: 87).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

4 (623). **V. trigyna** Waldst. et Kit. 1802, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 1: 34. — *V. corolliflora* Zossim. ex Buttler, 1975, Mitt. Bot. Staatssamm. München, 12: 289; Zossim. 1940, Свекловодство, 1: 26, descr. ross.

Описан из Венгрии.

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар.

Указан для **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх. (Капеллер, 1947: 132, 1975: 166; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 291).

Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Trib. 3. **Chenopodieae** Dumort.

4 (95). **Chenopodium** L.

1 (624). **C. ambrosioides** L. 1753, Sp. Pl.: 219. — *C. anthelminticum* auct. non L.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 123.

Описан из Мексики.

ЗЗ: Адж. **ЮЗ:** Ю. Караб.

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Капеллер, 1947: 143).

Центр., Южн. Америка. Заносное и широко распространившееся растение в Центр., Юго-Вост., Вост. Европе; Средиз.; Африке; Америке; Австралии.

2 (625). **C. botrys** L. 1753, Sp. Pl.: 219. — *Ambrina botrys* (L.) Moq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 37. — *Neobotrydium botrys* (L.) Moldenke, 1946, Amer. Midl. Nat. 35: 330. — *Chenopodium foetidum* auct. non Schrad. 1808, nec Lam. 1778: Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 903; Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 58.

Описан из Южной Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗ; Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1978: 218); **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 218; Очиаури, 1981: 58); **ЦЗ:**