

Описан по материалам из Джунгарии и с восточного побережья Каспийского моря.

**ВЗ:** Ширв.

Ср. Азия.

4 (720). **A. aphylla** L. 1753, Sp. Pl.: 223.

Описан с побережья Каспийского моря («Hab. ad maris Caspii litora»).

**ВП; ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 37); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 143); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Исаев, 1952: 255).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

Из Закавказья известны 2 разновидности этого вида — var. *australis* (Пјин) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 164 (*A. aphylla* subsp. *australis* Пјин, 1938, Бот. мат. (Ленинград), 7, 10: 214. — Ту р у с: «Проге urbem Nachiczevan, 20 X 1936, № 339, М. Пјин et E. Пјина» — LE!), распространенная в Нахичевани, и var. *rubra* (Пјин) Grossh. 1945, цит. соч.: 164 (*A. aphylla* subsp. *rubra* Пјин, 1938, цит. соч.: 214. — Ту р у с: «Inter Baku et Schemacha, 23 IX 1936, № 114, М. Пјин et E. Пјина» — LE!) — в районе между Баку и Шемахой.

#### 28 (119). **Seidlitzia** Bunge ex Boiss.

1 (721). **S. florida** (Bieb.) Bunge ex Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 951. — *Anabasis florida* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 190.

Описан из Закавказья («In collibus aridis Armeniae Iberiae, versus Cyrum fluvium»).

**ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия.

#### 29 (120). **Girgensohnia** Bunge

1 (722). **G. oppositiflora** (Pall.) Fenzl, 1851, in Ledeb. Fl. Ross. 3: 835. — *Sal-sola oppositiflora* Pall. 1773, Reise Russ. Reich. 2: 735. — *Anabasis oppositiflora* (Pall.) Bieb. 1806, Мém. Soc. Nat. Moscou, 1: 148. — *Halogeton oppositiflorus* (Pall.) С. А. Меу. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 378.

Описан из низовий Урала.

**ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 375).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

#### 30 (121). **Halanthium** С. Koch

1 (723). **H. rarifolium** С. Koch, 1843, Linnaea, 17: 314; Ильин, 1936, Фл. СССР, 6: 343, «gariflorum»; Боч. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 100. — *H. aucheri* Моq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 204.

Описан из Южного Закавказья («In planitie ad Арахет»).

**ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Ю. Караб. (Исаев, 1952: 259).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

2 (724). **H. kulpianum** (C. Koch) Bunge, 1862, Мém. Acad. (Sci. Phys.-Math.), ser. 7, 4, 11: 80 (Anabas. Revis). — *Halimocnemis kulpiana* C. Koch, 1843, Linnaea 17: 313.

Описан из б. Карской области Турции («In Armenia trans Araxem sita prope pagum Kulp»).

**ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1978: 231; Муртазалиев, 2001, 1: 148), Ман.-Самур.; **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1945: 169; Исаев, 1952: 259).

Юго-Зап. Азия (Турция).

### 31 (122). **Ofaiston** Raf.

1 (725). **O. monandrum** (Pall.) Moq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 203. — *Salsola monandra* Pall. 1776, Reise Russ. Reich. 3: 724, tab. M, fig. 1. — *S. dichotoma* Pall. 1776, l. c.: 604, 635. — *Halogeton monandrus* (Pall.) C. A. Mey. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 379.

Описан из бассейна Нижней Волги.

**ВП:** В. Ставр. («Левый берег Чограя, 4 км от Арзгира»), Тер.-Кум. («Дагестанская АССР, Караногайские солончаки, на пути от аула Ленина к Терекли, 21 VIII 1932, Н. Кузнецов; Бажиганские пески, понижение, Ачикулакский район Грозненской области, 6 IX 1954, И. Каменецкий»).

Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

Впервые для Кавказа этот редкий вид приведен Ю. Л. Меницким (1994: 112) без точного указания местонахождения. Позднее другими авторами (Иванов, 1997; Михеев, 2009; Муртазалиев, 2009) вид для Кавказа не приводился. В Гербарии ЛЕ мы обнаружили три гербарных образца этого вида из Вост. Предкавказья, процитированные выше. — Прим. Г. Л. Кудряшовой и Н. Н. Цвелёва.

### 32 (123). **Gamanthus** Bunge

1 (726). **G. pilosus** (Pall.) Bunge, 1862, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 4, 11: 79. — *Salsola pilosa* Pall. 1773, Reise Russ. Reich. 2: 477. — *Polycnemum malacophyllum* Vieb. 1806, Мém. Soc. Nat. Moscou, 1: 152. — *Halimocnemis malacophylla* C. A. Mey. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 387. — *Halanthium pilosum* (Pall.) Benth. ex Volkens, 1893, in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3, 1a: 89; Фомин и Воронов, 1911, Определ. Раст. Кавк. и Крыма, 2, 1: 146; Боч. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 100.

Описан по материалам из Закавказья и северного Ирана.

**ВК:** В. Сулак.; Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 149); **ВЗ:** Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 170; Исаев, 1952: 260); **ЮЗЗ:** Месх. (Капеллер, 1947: 185); **Т** (Гроссгейм, 1945: 170; Исаев, 1952: 260).

Сев., Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.