

5 (731). **P. brachiata** (Pall.) Bunge, 1862, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 4, 11: 59. — *Polyscnemum brachiatum* Pall. 1803, III. Pl.: 62, tab. 52.

Описан по материалам из прикаспийских пустынь, Причерноморья и Крыма.

**ВП; ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т:** Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1978: 230; Зернов, 2006: 243); **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 37); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 147).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран) Азия.

### 34 (125). **Halimocnemis** C. A. Mey.

1 (732). **H. sclerosperma** (Pall.) C. A. Mey. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 387 — *Polyscnemum sclerospermum* Pall. 1776, Reise Russ. Reich. 3: 725, tab. M, fig. 2; id. 1803, III. Pl.: 65.

Описан по материалам из бассейнов Нижней Волги и Нижнего Урала.

Указан для **ВЗ:** (Ильин, 1936: 332); **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1945:168).

Вост. Европа; Ср. Азия.

### 35 (126). **Halotis** Bunge

1 (733). **H. pilifera** (Моq.) Botsch. 1971, Новости сист. высш. раст. 8: 262; Меницкий, 1994, Бот. журн. 79, 5: 113. — *Halimocnemis pilifera* Моq. 1839, Hist. Mém. Acad. Sci. Toulouse, 5, 1: 181. — *H. pilosa* Моq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 152. — *Halotis pilosa* (Моq.) Пjин, 1936, Фл. СССР, 6: 339.

Описан из Ирана.

**ЮЗ:** Ерев., Дар.

Указан для **ЮЗ:** Нах. (Ильин, 1938: 217; Гроссгейм, 1945: 168; Карягин, 1952: 258).

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

## Superordo Polygonanae

### ORDO 13. POLYGONALES

Fam. 46. **POLYGONACEAE** Juss., nom. cons.

Subfam. POLYGONOIDEAE Eaton

Trib. 1. **Rumiceae** Dumort.\*

1 (127). **Rheum** L.

Sect. 1. **Orbicularia** Losinsk.

1 (734). **R. turkestanicum** Janisch. 1922, Список раст. Герб. русск. фл. 8: 92, № 2570. — *R. rupestre* Litv. ex Losinsk. 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 108.

\* А. Е. Грабовская-Бородина (Бородина, 1979, 1989).