

- 2 (621). **V. macrorrhiza** Steven, 1812, Mém. Soc. Nat. Moscou, 3: 257.
 Описан с Восточного Кавказа («in glareosis alpium circa Chinalug»).
ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Иорск.-Шек; **ЮЗ:** Севан.
 Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв. (Рзаде, 1952: 189); **ЮЗ:** Ерев. (Тахтаджян, Фёдоров, 1972: 87), Дар. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 286).
 Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).
- 3 (622). **V. lomatogona** Fisch. et C. A. Mey. 1838, in Hohen. Bull. Soc. Nat. Moscou, 3: 360.
 Описан из Тальша. Турus: «Bei Tatuni, № 2328» (LE!).
ЮЗЗ: Араг; **Т:**
 Указан для **ЮЗ:** Ерев. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 291; Тахтаджян, Фёдоров, 1972: 87).
 Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).
- 4 (623). **V. trigyna** Waldst. et Kit. 1802, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 1: 34. — *V. corolliflora* Zossim. ex Buttler, 1975, Mitt. Bot. Staatssamm. München, 12: 289; Zossim. 1940, Свекловодство, 1: 26, descr. ross.
 Описан из Венгрии.
СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар.
 Указан для **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх. (Капеллер, 1947: 132, 1975: 166; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 291).
 Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Trib. 3. **Chenopodieae** Dumort.

4 (95). **Chenopodium** L.

- 1 (624). **C. ambrosioides** L. 1753, Sp. Pl.: 219. — *C. anthelminticum* auct. non L.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 123.
 Описан из Мексики.
ЗЗ: Адж. **ЮЗ:** Ю. Караб.
 Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Капеллер, 1947: 143).
 Центр., Южн. Америка. Заносное и широко распространившееся растение в Центр., Юго-Вост., Вост. Европе; Средиз.; Африке; Америке; Австралии.
- 2 (625). **C. botrys** L. 1753, Sp. Pl.: 219. — *Ambrina botrys* (L.) Moq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 37. — *Neobotrydium botrys* (L.) Moldenke, 1946, Amer. Midl. Nat. 35: 330. — *Chenopodium foetidum* auct. non Schrad. 1808, nec Lam. 1778: Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 903; Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 58.
 Описан из Южной Европы.
ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗ; Т:**
 Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1978: 218); **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 218; Очиаури, 1981: 58); **ЦЗ:**

Триал.-Н. Карт. (Капеллер, 1947: 145); всех районов Азербайджана (Карягин, 1952: 192).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

3 (626). **C. chenopodioides** (L.) Aellen, 1933, *Ostenia*: 98. — *Blitum chenopodioides* L. 1771, *Mantissa Alt.* 2: 170. — *Chenopodium botryoides* Sm. 1811, in Sowerby, *Engl. Bot.* 32: tab. 2227.

Описан из Восточной Европы («Tataria»).

ЗП: З. Ставр.; **ВП**: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВЗ**: Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах.; **Т**.

Указан для **ВП**: В. Ставр. (Галушко, 1978: 219; Танфильев, Кононов, 1987: 34).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Африка; Сев. Америка (заносное).

4 (627). **C. glaucum** L. 1753, *Sp. Pl.*: 220.

Описан из Европы.

ЗП; **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК**: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Ширв., Н. Кур.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Севан., Нах.; **Т**.

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978:219); Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ВП**: Тер.-Сулак.; **ЗК**: Бело-Лаб.; **ВК**: Ассо-Арг.; **ЗЗ**: Инг.-Рион., Адж.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; **ЮЗ**: Ерев. (Гроссгейм, 1945: 124; Капеллер, 1947: 146; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 240).

Европа; Средиз.; Азия.

5 (628). **C. rubrum** L. 1753, *Sp. Pl.*: 218.

Описан из Европы.

ЮЗ: Ерев., Севан.

Указан для **ЗП**; **ВП**; **ЗК**: Уруп-Теб.; **ЦК**; **ВК**: Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1945: 124; Галушко, 1978: 219; Очиаури, 1981: 58; Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (Капеллер, 1947: 146); **ВЗ**: Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **Т** (Гроссгейм, 1945: 124; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 240).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Америка.

6 (629). **C. polyspermum** L. 1753, *Sp. Pl.*: 220.

Описан из Европы.

ЗП; **ВП**; **ЗК**: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ВК**: Кубин.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ**: Ерев., Заг.; **Т**.

Указан для **ЗК**: В. Куб. (Гроссгейм, 1945: 124; Галушко, 1978: 218); **ЦК**: В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ВК**: Ман.-Самур.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 124; Карягин, 1952: 194); **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах. (Капеллер, 1947: 139).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. Азия.

7 (630). **C. murale** L. 1753, *Sp. Pl.*: 219.

Описан из Европы.

ЦК: Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1945: 125); **ЮЗЗ:** Месх. (Капеллер, 1947: 141).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр., Южн. Азия; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

8 (631). **C. hybridum** L. 1753, Sp. Pl.: 219.

Описан из Европы.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 218); **ЗК:** В. Куб.; **ВК:** В. Сулак. (Гроссгейм, 1945: 125); **ЦЗ:** Лори (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 245); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 125; Капеллер, 1947: 140; Карягин, 1952: 195); **ЮЗЗ:** Месх. (Капеллер, 1947: 140); **ЮЗ:** Занг. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 245).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

9 (632). **C. urbicum** L. 1753, Sp. Pl.: 218.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Нах.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 218; Танфильев, Кононов, 1987: 55); **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1945: 125; Капеллер, 1947:141; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 245).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия.

10 (633). **C. album** L. aggr.

10а. **C. album** L. 1753, Sp. Pl.: 219.

Описан из Европы.

ЗП; ВП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк.; **ВК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 219); Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 35); Грузии (Капеллер. 1947: 135); Армении (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 245); Азербайджана (Карягин, 1952:196).

Евразия; Сев. Африка; Сев. Америка.

10б. **C. opulifolium** Schrad. ex DC. 1815, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, Suppl.: 372; Schrad. ex W. D. J. Koch et Ziz, 1814, Cat. Pl.: 6, nom. nud.

Описан из Германии.

ЗК: Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для **ЗП:** 3. Ставр.; **ВП:** В. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 126; Танфильев, Кононов, 1987: 35).

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

10с. **C. strictum** Roth, 1821, Nov. Pl. Sp. Ind. Or.: 180. — *C. album* L. subsp. *striatum* (Крашан) Murr, 1904, in Urb. u. Graebn. Festschr. Ascherson: 222.

Описан с востока Индии.

ВП: В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ВЗ:** Ширв.; **Т:**

Указан для всех районов Кавказа (Гроссгейм, 1945: 126); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Капеллер, 1947: 136).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Южн. Азия; Африка; Сев., Южн. Америка (заносное).

11 (634). **C. vulvaria** L. 1753, Sp. Pl.: 220.

Описан из Европы.

ЗП: 3. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ВК:** В. Сулак. (Гроссгейм, 1945: 128; Галушко, 1978: 218; Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ЗЗ:** Адж. (Капеллер, 1947: 138); **ЦЗ:** Лори (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 246); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Капеллер, 1947: 138); всех низменных и среднегорных районов Азербайджана (Карягин, 1952: 197); **ЮЗ:** Ерев., Занг. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 246).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Африка; Сев., Южн. Америка (заносное); Австралия (заносное).

12 (635). **C. sosnowskyi** Kapeller, 1927, Вестн. Тифл. бот. сада, сер. 3, 3–4: 45.

Описан по материалам из Закавказья и Талыша. *Lectotypus* (Гроссгейм, 1945: 128): «Prov. Tiflis, distr. Gori, pag. Bakuriani, in Horto alpino Bakurianensi, 27 VIII 1913, W. Kozlowski» (ТВИ).

ЗП: Аз.-Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб. (Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 58); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Капеллер, 1975:179); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх. (Капеллер, 1947: 142; Карягин, 1952: 197); **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 246).

Юго-Зап. Азия (Турция, ?Иран, Афганистан).

13 (636). **C. foliosum** Asch. 1864, Fl. Prov. Brandenb. 1: 572. — *Blitum virgatum* L. 1753, Sp. Pl.: 4.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1987: 216); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 237); **ЦЗ:** Лори (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 240); **ВЗ:** Н. Кур., Караб. (Гроссгейм, 1945: 123; Карягин, 1952: 192); **ЮЗ:** Дар., Занг., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 123; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 240).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия.

Trib. 4. **Atripliceae** Duby

5 (96). **Axyris** L.

1 (637). **A. caucasica** (Sommier et Levier) Lipsky, 1899, Тр. Тифл. бот. сада, 4: 430 (Фл. Кавк.). — *A. sphaerosperma* Fisch. et C. A. Mey. var. *caucasica* Sommier et Levier, 1894, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 2: 196.

Описан с Западного Кавказа («Kuban, regio montana, in vallium Tieberda et Dout clivis sterilibus et in tectis herbosis tuguriorum pagi Utschkulan et pagi Chursuk, ubi diebus 2–14 IX Ligimus (1300–1500 m). In Convalle Asau (Elbrus or.) legit Loicka»). *Л е с т о т у р у с* (Kudrjaschova, Tatanov, hoc loco): «In ditone Kuban in tectis domarum pagi Utschkulan — 1360 m, 7 IX 1890, S. Sommier et E. Levier [pl. sinistr.]» (LE!; syntypi — FI!).

ЗК: Уруп-Теб., В.-Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.

Указан для **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 223).

Эндемик.

2 (638). **A. amaranthoides** L. 1753, Sp. Pl.: 979; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 239.

Описан из Восточной Сибири.

Указан для **СЗЗ:** Анап.-Гел. (заносное) (Зернов, 2006: 239).

Сев., Центр. Азия. Заносное в Европе; Сев., Вост. Азии; Сев. Америке.

6 (97). **Atriplex** L., nom. cons.

1 (639). **A. sagittata** Borkh. 1793, Rhein. Mag. 1: 477. — *A. nitens* Schkuhr, 1803, Bot. Handb. 3: 541. — *A. acuminata* Waldst. et Kit. 1805, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 2: 107, tab. 103.

Описан из Германии.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ВК:** Ман.-Самур.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1945: 130; Галушко, 1978: 220), В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 135); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Гроссгейм, 1945: 130; Зернов, 2006: 239); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Капеллер, 1947: 151); **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 130; Мусаев, 1988: 28); **ЮЗ:**