

5 (731). **P. brachiata** (Pall.) Bunge, 1862, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 4, 11: 59. — *Polyscnemum brachiatum* Pall. 1803, III. Pl.: 62, tab. 52.

Описан по материалам из прикаспийских пустынь, Причерноморья и Крыма.

ВП; ВК: Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т:** Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1978: 230; Зернов, 2006: 243); **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 37); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 147).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран) Азия.

34 (125). **Halimocnemis** C. A. Mey.

1 (732). **H. sclerosperma** (Pall.) C. A. Mey. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 387 — *Polyscnemum sclerospermum* Pall. 1776, Reise Russ. Reich. 3: 725, tab. M, fig. 2; id. 1803, III. Pl.: 65.

Описан по материалам из бассейнов Нижней Волги и Нижнего Урала.

Указан для **ВЗ:** (Ильин, 1936: 332); **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1945:168).

Вост. Европа; Ср. Азия.

35 (126). **Halotis** Bunge

1 (733). **H. pilifera** (Моq.) Botsch. 1971, Новости сист. высш. раст. 8: 262; Меницкий, 1994, Бот. журн. 79, 5: 113. — *Halimocnemis pilifera* Моq. 1839, Hist. Mém. Acad. Sci. Toulouse, 5, 1: 181. — *H. pilosa* Моq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 152. — *Halotis pilosa* (Моq.) Пjин, 1936, Фл. СССР, 6: 339.

Описан из Ирана.

ЮЗ: Ерев., Дар.

Указан для **ЮЗ:** Нах. (Ильин, 1938: 217; Гроссгейм, 1945: 168; Карягин, 1952: 258).

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

Superordo Polygonanae

ORDO 13. POLYGONALES

Fam. 46. **POLYGONACEAE** Juss., nom. cons.

Subfam. POLYGONOIDEAE Eaton

Trib. 1. **Rumiceae** Dumort.*

1 (127). **Rheum** L.

Sect. 1. **Orbicularia** Losinsk.

1 (734). **R. turkestanicum** Janisch. 1922, Список раст. Герб. русск. фл. 8: 92, № 2570. — *R. rupestre* Litv. ex Losinsk. 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 108.

* А. Е. Грабовская-Бородина (Бородина, 1979, 1989).

Описан из Средней Азии.

ЮЗЗ: Араг. (с. Арагац); **ЮЗ:** Ерев. (Урцский хр.), Нах. Юго-Зап. (вост. Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

Sect. 2. **Ribesiformia** Losinsk.

2 (735). **R. ribes** L. 1753, Sp. Pl.: 372.

Описан по материалам из Ирана, Ливана и Палестины.

ЮЗ: Нах. (окр. Биченаха).

Юго-Зап. Азия (от вост. Турции и Палестины до Пакистана).

2 (128). **Rumex** L.

Subgen. 1. **Acetosella** (Meissn.) Rech. f.

1 (736). **R. acetosella** L. 1753, Sp. Pl.: 338; Á. Löve, 1941, Bot. Not. (Lund): 160, descr. emend. — *R. multifidus* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 260, p. p.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тиб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Европа; Сев., Вост. Азия; Сев. Америка.

2 (737). **R. acetoselloides** Bal. 1854, Bull. Soc. Bot. Fr. 1: 282. — *R. acetosella* L. subsp. *acetoselloides* (Bal.) Den Nijs, 1984, Feddes Repert. 95: 60.

Описан из Турции. *Synonymy*: «Pl. d'Orient, № 351, Fl. Smyrne, dans les moissons, 21 V; Fr. Yaila de Bozdagh (Tmolus occidental.), 17 VII 1854, Balansa» (G; isosyntypus — LE!).

ЦК; ВК: В. Сулак. (с. Эрпели), Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мерг.-Зан.

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Ливан).

Subgen. 2. **Acetosa** (Mill.) Rech. f.

Sect. 1. **Scutati** Á. Löve

3 (738). **R. scutatus** L. 1753, Sp. Pl.: 337.

Описан из Европы.

3а. **R. scutatus** L. subsp. **hastifolius** (Bieb.) Borodina, 1979, Новости сист. высш. раст. 15: 104. — *R. hastifolius* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 290.

Описан по материалам с Центрального Кавказа и из Закавказья. *Lectotypus* (Бородина, 1979: 104): «Ex Caucaso altiore, inter Lars et Kasbek lectus a. 1802» (LE — Herb. Bieb!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тиб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ; Т.**