

Описан из Средней Азии.

ЮЗЗ: Араг. (с. Арагац); **ЮЗ:** Ерев. (Урцский хр.), Нах. Юго-Зап. (вост. Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

Sect. 2. **Ribesiformia** Losinsk.

2 (735). **R. ribes** L. 1753, Sp. Pl.: 372.

Описан по материалам из Ирана, Ливана и Палестины.

ЮЗ: Нах. (окр. Биченаха).

Юго-Зап. Азия (от вост. Турции и Палестины до Пакистана).

2 (128). **Rumex** L.

Subgen. 1. **Acetosella** (Meissn.) Rech. f.

1 (736). **R. acetosella** L. 1753, Sp. Pl.: 338; Á. Löve, 1941, Bot. Not. (Lund): 160, descr. emend. — *R. multifidus* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 260, p. p.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Европа; Сев., Вост. Азия; Сев. Америка.

2 (737). **R. acetoselloides** Bal. 1854, Bull. Soc. Bot. Fr. 1: 282. — *R. acetosella* L. subsp. *acetoselloides* (Bal.) Den Nijs, 1984, Feddes Repert. 95: 60.

Описан из Турции. S y n t y p i: «Pl. d'Orient, № 351, Fl. Smyrne, dans les moissons, 21 V; Fr. Yaila de Bozdagh (Tmolus occidental.), 17 VII 1854, Balansa» (G; isosyntypus — LE!).

ЦК; ВК: В. Сулак. (с. Эрпели), Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Ливан).

Subgen. 2. **Acetosa** (Mill.) Rech. f.

Sect. 1. **Scutati** Á. Löve

3 (738). **R. scutatus** L. 1753, Sp. Pl.: 337.

Описан из Европы.

3а. **R. scutatus** L. subsp. **hastifolius** (Bieb.) Borodina, 1979, Новости сист. высш. раст. 15: 104. — *R. hastifolius* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 290.

Описан по материалам с Центрального Кавказа и из Закавказья. L e c t o t y p u s (Бородина, 1979: 104): «Ex Caucaso altiore, inter Lars et Kasbek lectus a. 1802» (LE — Herb. Bieb!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ЦК**: В. Кум. (Михеев, 2009: 17).
Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. и сев.-зап. Иран).

Sect. 2. **Acetosa**

4 (739). **R. acetosa** L. 1753, Sp. Pl.: 337, nom. cons.

Описан из Европы.

ЗП: 3. Ставр.; **ВП**: Тер.-Сулак.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир.; **ЦЗ**; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах.

Европа; Сев., Юго-Зап. (Иран, Афганистан, Пакистан), Вост., Юго-Вост. Азия; Сев. Америка.

5 (740). **R. arifolius** All. 1773, Auct. Syn. Stirp. Horti Taur.: 42; id. 1774, Misc. Philos.-Math. Soc. Taur. 5: 94; id. 1785, Fl. Pedem. 2: 204.

Описан из Италии (Пьемонт) («in pratis alpium non infrequens est»).

5а. **R. arifolius** All. subsp. **arifolius**. — *R. alpestris* auct. non Jacq.: Бородина, 1989, Новости сист. высш. раст. 26: 59 et al. auct. fl. саус.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан.; **Т**.

Центр., Южн. Европа; Ср. Азия.

5б. **R. arifolius** All. subsp. **amplexicaulis** (Lapeyr.) Nyman, 1881, Consp. Fl. Europ. 3: 635. — *R. amplexicaulis* Lapeyr. 1813, Hist. Pl. Pyrenées: 200. — *R. rugosus* Campd. 1819, Monogr. *Rumex*: 113; Бородина, 1989, Новости сист. высш. раст. 26: 59. — *R. arifolius* auct. non All.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 89, p. p. et al. auct. fl. саус.

Описан из Пиренеев.

ЗК: Уруп-Теб.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах.

Атл. (юг), Центр., Южн., Юго-Вост. (Карпаты) Европа; Средиз. (европ. часть).

6 (741). **R. thyrsiflorus** Fingerh. 1829, Linnaea, 4: 380. — *R. haplorhizus* Czern. ex Turcz. 1854, Bull. Soc. Nat. Moscou, 27, 3: 54. — *Acetosa thyrsiflora* (Fingerh.) Á. Löve et D. Löve, 1948, Icel. Univ. Inst. Appl. Sci. Dept. Agric. Rep. B, 3: 107.

Описан из Центральной Европы.

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК**: Малк.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ**: Ерев.

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

7 (742). **R. tuberosus** L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 481.

Описан из Италии.

7а. **R. tuberosus** L. subsp. **horizontalis** (C. Koch) Rech. f. 1949, Candollea, 12: 31. — *R. horizontalis* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 211.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин. (Кусары); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Южн. Европа; Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ирак, сев. и сев.-зап. Иран), Ср. (Копетдаг) Азия; Сев. Африка.

Subgen. 3. **Rumex**

Sect. 1. **Rumex**

8 (743). **R. hydrolapathum** Huds. 1778, Fl. Angl. ed. 2, 1: 154.

Описан из Англии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗЗ:** Абх., Рион.-Квир.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. (сев.-зап. Турция), Ср. Азия.

9 (744). **R. crispus** L. 1753, Sp. Pl.: 335. — *R. domesticus* auct. non Hartm.: Лозинск. 1936, Фл. СССР, 5: 458, р. р.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 90 et al. auct. fl. саус.

Описан из Европы.

ЗП; **ВП;** **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ;** **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Европа; Азия; Африка (заносное); Сев., Центр. Америка; Австралия.

10 (745). **R. stenophyllus** Ledeb. 1830, Fl. Alt. 2: 58.

Описан с Алтая.

ЗП: Аз.-Куб, З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (окр. с. Джалабет).

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия.

11 (746). **R. patientia** L. 1753, Sp. Pl.: 333.

Описан из Италии.

11а. **R. patientia** L. subsp. **patientia**. — *R. patientia* subsp. *eupatientia* Rech. f. 1933, Feddes Repert. 31: 246. — *R. domesticus* auct. non Hartm.: Лозинск. 1936, Фл. СССР, 5: 458, р. р.

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг.; **Т.**

Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

11б. **R. patientia** L. subsp. **orientalis** (Bernh. ex Schult.) Danser, 1924, Nederl. Kruidk. Arch. 1923: 281. — *R. orientalis* Bernh. ex Schult. 1830, in Roem. et Schult. Syst. Veg. 7, 2: 1433.

Описан по экземплярам, выращенным из семян, привезенных с «Востока».

ЗП: Аз.-Куб.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция, Сирия, сев.-зап. Иран, Афганистан, Пакистан), Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

12 (747). **R. ponticus** E. H. L. Krause, 1909, Beih. Bot. Centralbl. 24, 2: 15; Rech. f. 1933, Feddes Repert. 31: 235, descr. emend.; Бородина, 1989, Новости сист. высш. раст. 26: 60. — *R. patientia* L. var. *kurdicus* Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 1009. — *R. artemus* auct. non C. Koch: Лозинск. 1936, Фл. СССР, 5: 467, р. р.

Описан из северо-восточной Турции. Тур у s: «Iter orientale, № 7072, Armenia turcica, Gumuschkhane: Roejukder supra Artabir, 31 VII 1894, P. Sintenis [det. J. Freyn]» (G; isotуpи — L, LE!, S!, W).

ЮЗ: Ерев. (Агверан), Нах., Занг. (с. Аревис).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, Ирак, зап. Иран).

13 (748). **R. aquaticus** L. 1753, Sp. Pl.: 336.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Ерев. (хр. Цахкуняц), Севан., ?Занг. (с. Аревис), ?Мегр.-Зан. (с. Гудемнис).

Сев., Центр., Вост. Европа; Сев., Ср., Вост. Азия.

14 (749). **R. alpinus** L. 1753, Sp. Pl.: 334, nom. cons.; Cafferty a. Snogerup, 2000, Taxon, 49: 571, nom. cons. prop.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

15 (750). **R. armenus** C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 209.

Описан из Армении («Im Gaue Daratschitschak auf den dortigen Hochsteppen mit basaltischer Grundlage, 4000–5000' hoch»). Тур у s (fide Edmondson, Lack, 1977: 343): В.

ЮЗ: Ерев. (Цахкадзор).

Эндемик.

16 (751). **R. confertus** Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 1: 397.

Описан по растениям неизвестного происхождения, культивированным в Ботаническом саду в Берлине.

ВЗ: Мург.-Муровд.

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев, Ср., Центр. Азия; Сев. Америка.

17 (752). **R. gracilescens** Rech. f. 1959, Phytion, 8: 143; Бородина, 1989, Новости сист. высш. раст. 26: 59. — *R. alpinus* auct. non L.: Лозинск. 1936, Фл. СССР, 5: 468, р. min. p.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 91, р. min. p.

Описан с северо-востока Турции. Тур у s: «Armenia turcica, Karakose, secus rivulos in jugo inter Agri (Karakos) et Horasan, ca. 2500 m, № 15022, Rechinger» (W).

ЮЗ: Ерев. (гора Алибек).

Юго-Зап. Азия (сев., вост. Турция).

18 (753). **R. angustifolius** Campd. 1819, Monogr. *Rumex*: 63, 73, tab. 1, fig. 3.

Описан из восточной Турции («Hab. [Cappadocium], Dun. in h. Tournefort»).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос. (Бакуриани); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг.

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан, Ирак, сев.-зап. и зап. Иран).

19 (754). **R. sanguineus** L. 1753, Sp. Pl.: 334. — *R. condylodes* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Саус. 1: 288; id. 1819, l. c. 3: 278. — *R. nemorosus* Schrad. ex Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 1: 397.

Описан из Северной Америки.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Караб.; **ЮЗ:** Занг.; **Т.**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран); Сев. Америка (заносное).

20 (755). **R. conglomeratus** Murray, 1770, Prodr. Stirp. Götting.: 52. — *R. nemolapathum* Ehrh. 1787, Beitr. Naturk. 1: 181.

Описан из Центральной Европы.

ЗП; ВП; ЗК; ВК: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб., Н. Кур.; **ЮЗ:** Дар., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия; Сев. Африка.

21 (756). **R. obtusifolius** L. 1753, Sp. Pl.: 335.

Описан из Европы.

21а. **R. obtusifolius** L. subsp. **subalpinus** (Schur) Čelak. 1871, Prodr. Fl. Böhmen, 2: 159. — *R. daghestanicus* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 209. — *R. obtusifolius* var. *subalpinus* Schur, 1866, Enum. Pl. Transsilv.: 579. — *R. sylvestris* (Lam.) Wallr. subsp. *subalpinus* (Schur) Simonk. 1887, Enum. Fl. Transsilv.: 472.

Описан из Румынии.

ЗП; ЗК; ЦК; ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг., Мегр.-Зан., Нах., Ю. Караб.; **Т.**

Южн., Центр., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. и сев.-зап. Иран).

21б. **R. obtusifolius** L. subsp. **transiens** (Simonk.) Rech. f. 1932, Beih. Bot. Centralbl. 49, 2: 52. — *R. sylvestris* (Lam.) Wallr. var. *transiens* Simonk. 1881, Math. Term. Közl. 16: 119.

Описан из Центральной Европы.

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Адж.

Центр., Вост. Европа.

22 (757). **R. chalepensis** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 11; Бородина, 1989, Новости сист. высш. раст. 26: 61. — *R. denticulatus* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 208, non Campd. 1819. — *R. syriacus* Meisn. 1856, in DC. Prodr. 4: 53. — *R. dictyocarpus* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 192. — *R. obtusifolius* auct. non L.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 94, p. min. p.

Описан из Сирии.

ВЗ: Ширв.; **ЮЗЗ:** Араг. (с. Артени); **ЮЗ:** Ерев., Севан. (с. Цовазард).

Юго-Зап. (от юго-вост. Турции и Сирии до Пакистана), Ср., Вост., Южн. Азия.

23 (758). **R. pulcher** L. 1753, Sp. Pl.: 336.

Описан по материалам из Франции и Италии.

23а. **R. pulcher** L. subsp. **pulcher**. — *R. pulcher* subsp. *eupulcher* Rech. f. 1932, Beih. Bot. Centralbl. 49, 2: 26.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карп.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Атл., Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. (Турция, Сирия, страны Аравийского п-ова, сев. и сев.-зап. Иран), Ср. Азия; Сев. Африка.

23б. **R. pulcher** L. subsp. **divaricatus** (L.) Arcang. 1882, Comp. Fl. Ital.: 585. — *R. divaricatus* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 478.

БК: Ман.-Самур.

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия); Сев. Африка.

Описан из Италии.

23с. **R. pulcher** L. subsp. **anodontus** (Hausskn.) Rech. f. 1932, Beih. Bot. Centralbl. 49, 2: 34; Бородина, 1989, Новости сист. высш. раст. 26: 62. — *R. pulcher* var. *anodonta* Hausskn. 1891, Mitt. Thüring. Bot. Ver. 1: 34. — *R. pulcher* f. *anodontus* (Hausskn.) Beck, 1904, in Rchb. Icon. Fl. Germ. Helv. 24: 39.

Описан по материалам с Балканского п-ова и из Ирака.

Т.

Юго-Вост. Европа (юг); Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран); Сев. Африка.

Sect. 2. **Orientales** A. I. Baranov et Skvortsov

24 (759). **R. dentatus** L. 1771, Mantissa Alt.: 226.

Описан из Египта.

24а. **R. dentatus** L. subsp. **halacsyi** (Rech.) Rech. f. 1932, Beih. Bot. Centralbl. 49, 2: 16. — *R. strictus* Link, 1821, Enum. Horti Berol. Alt. 1: 350. — *R. × halacsyi* Rech. 1899, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 49: 105. — *R. reticulatus* auct. non Bess. ex Spreng.: Лозинск. 1936, Фл. СССР, 5: 475; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 94 et auct. fl. cauc.

Описан из Греции.

ЗП: Аз.-Куб., З. Ставр.; **ВП;** **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Мегр.-Зан., Нах.; **Т.**

Южн., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. (от Турции и стран Аравийского п-ова до Афганистана), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

25 (760). **R. maritimus** L. 1753, Sp. Pl.: 335.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан.

Европа; Сев., Вост. Азия; Сев. Америка.

26 (761). **R. marschallianus** Rechb. 1826, Icon. Bot. Pl. Crit. 4: 58; id. 1828, l. c. 6: 13. — *R. aegyptiacus* auct. non L.: Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 290.

Описан из низовьев Волги. Турус: «Ad Wolgam circa Astrachan et Sareptam» (LE — Herb. Vieb!).

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.

Вост. Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия.

27 (762). **R. palustris** Sm. 1800, Fl. Brit. 1: 394; Цвел. 1992, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 97, 5: 101.

Описан из Англии.

ЗП: Аз.-Куб. (засоренный луг по правому берегу Старой Кубани в Краснодаре).

Центр., Южн., Вост. (юг), Европа; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

3 (129). **Oxyria** Hill

1 (763). **O. digyna** (L.) Hill, 1769, Hort. Kew: 158. — *Rumex digynus* L. 1753, Sp. Pl.: 337. — *Oxyria elatior* R. Br. ex Meisn. 1832, Pl. Asiat. Rar. 3: 64.

Описан из Европы.

ЗК; **ЦК;** **ВК:** Асо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев. (Гегамский хр.), Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан. (Зангезурский хр.).

Сев., Южн., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (от Турции до Пакистана), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Trib. 2. **Persicarieae** Dumort.

4 (130). **Persicaria** (L.) Mill.*

Sect. 1. **Amphibia** Small

1 (764). **P. amphibia** (L.) Gray, 1821, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 268. — *Polygonum amphibium* L. 1753, Sp. Pl.: 361.

Описан из Европы.

* Н. Н. Цвелёв.