

et Spach) Boiss. — имеет еще более широкий (4–5 мм в диам.) отгиб чашечки с более развитыми лопастями. Последний вид указывается М. Е. Oganessian (2011) для окрестностей Ордубада, в чем мы не уверены.

### 3 (145). **Goniolimon** Boiss.

1 (849). **G. rubellum** (S. G. Gmel.) Klokov, 1949, в Гроссг. Определ. раст. Кавк.: 593; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 401; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 161. — *Statice rubella* S. G. Gmel. 1774, Reise Russland, 2: 199. — *Goniolimon besserianum* auct. non (Schult.) Kusn.: Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 191.

Описан из окр. Астрахани («um Astrachan»).

**ЗП**: 3. Ставр. («Р. Томузлов близ Китаева, 8 VII 1906, И. Новопокровский»).

Указан для **ВП**: В. Ставр. (окр. Моздока) (Тамамшян, 1967: 191, sub nom. *G. besserianum*).

Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-вост.), Ср. Азия.

Указания этого вида для Кавказа нуждаются в подтверждении.

2 (850). **G. tataricum** (L.) Boiss. 1848, in DC. Prodr. 12: 632; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 218; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 397; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 191; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 161. — *Statice tatarica* L. 1753, Sp. Pl.: 275. — *Goniolimon platypterum* Klokov, 1957, Фл. УРСР, 8: 522.

Описан с юго-востока европейской части России («in Tataria»).

**ЗП**; **ВП**: В. Ставр. (по Куме), Тер.-Кум.; **ЗК**: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**: Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **ЗЗ**: Инг.-Рион. (сев.-зап.); **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.

Юго-Вост., Вост. Европа.

Более низкорослые нагорные популяции с более развитыми крыльями на ветвях могут быть выделены в качестве разновидности — **G. tataricum** var. **platypterum** (Klokov) Tzvel. comb. et stat. nov. (т у р и с: «Предкавказье, в окр. г. Кисловодска, склоны холмов у дороги на гору Кольцо, 21 VII 1912, Е. Штукенберг» — LE!). Многочисленные более узкие листья имеют клухорские популяции, заслуживающие выделения в качестве **G. tataricum** var. **kluchoricum** Tzvel. var. nova (A var. *tatarica* foliis multis et angustioribus, anguste-lanceolatis, in petiolum sensim abeuntibus differt. — Т у р и с: «Grusia, distr. Kluchoricus, pag. Uczkulan, declivitas lapidosa, 1400 m, 30 VIII 1949, I. Vassiljev» — LE!).

3 (851). **G. tauricum** Klokov, 1957, Фл. УРСР, 8: 521, 138, рис. 32. — ?*G. glaberrimum* Klokov, 1957, цит. соч.: 523. — *G. tataricum* (L.) Boiss. var. *tauricum* (Klokov) Tzvel. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 161. — *G. tataricum* auct. non (L.) Boiss.: Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 437.

Описан из Крыма. Т у р и с: «Крым, Белогорский р-н, степь близ сел. Нижний Тайган, 19 VI 1929, В. Васильев» (LE!).

**ЦК**: Малк. (окр. Кисловодска); **СЗЗ**.

Юго-Вост. (вост.), Вост. (юг) Европа.

Тип *G. glaberrimum* («Кавказ, Кисловодск, VII 1886, И. Акинфиев») нами не был найден.

4 (852). **G. caucasicum** Klokov, 1957, Фл. УРСР, 8: 522; Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 593, descr. ross.; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 401, in adnot. ross. — *G. tataricum* (L.) Boiss. var. *puberulum* Trautv. 1856, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 14: 250.

Описан из Дагестана. *Typus*: «Prov. Dagestan, distr. Kaitag[o]-Tabasaran pr. Baschli, in declivitat. meridional argilloso m. Dashavan-dag, 1500', 9 VII 1898, Th. Alexeenko» (LE!).

**ВП**: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК**: Ассо-Арг. (сев.).

Эндемик.

Отличается прицветниками, стеблями, а обычно и листьями по всей поверхности коротко, но густо опушенными. Наиболее типичны образцы из Караногайских степей и полупустынь.

#### 4 (146). **Limonium** Mill., nom. cons.

##### Sect. 1. **Platyhymenium** (Boiss.) Lincz.

1 (853). **L. fischeri** (Trautv.) Lincz. 1952, Фл. СССР, 18: 427; Прилипко, 1957, Фл. Азерб. 7: 55; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 193. — *Statice fischeri* Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2: 481. — *Limonium nudum* auct. non (Boiss. et Buhse) Kuntze: Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 594.

Описан из Нахичевани. *Typus*: «Alindshi-tschai, 1871, № 30, G. Radde» (LE!, cum isotуро).

**ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Нах.

Эндемик?

Описанный с Эльбурса в Иране близкий вид *L. nudum* отличается более крупными внутренними прицветниками и более многоцветковыми колосками.

##### Sect. 2. **Limonium**

2 (854). **L. gmelinii** (Willd.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 436; Rech. f. a. Schiman-Czeika, 1974, in Rech. f. Fl. Iran. 108: 6; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 167. — *Statice gmelinii* Willd. 1798, Sp. Pl. 1: 1524. — *S. glauca* Willd. ex Schult. 1820, in Roem. et Schult. Syst. Veg. 6: 799.

Описан, вероятно, с юго-востока европейской части России (по протологу — «in Sibiria»). ? *Isotуро*: «*Statice Gmelinii* W. Herb. Fischer» (LE!).

**ЗП**: Аз.-Куб. (близ устья Кубани), З. Ставро. (сев.); **ВП**: В. Ставро. (близ сел. Ачикулак).

Юго-Вост. (Крым), Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. (Иран), Сев. (юг), Ср., Центр. Азия.

3 (855). **L. tomentellum** (Boiss.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 396; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 440; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 594; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 193; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 167. — *Statice tomentella* Boiss. 1848, in DC. Prodr. 12: 645. — *S. gmelinii* Willd. subsp. *tomentella* (Boiss.) Wangerin, 1912, Zeitschr. Naturwiss. 82: 443.

Описан из Нижнего Поволжья и «Сибири» («In deserto Wolgensi, Sibiria»).

**ВП**: Тер.-Кум. (сев.-вост.), Тер.-Сулак. (сев.).

Юго-Вост. (Присивашье), Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-зап.), Ср. (сев.-зап.) Азия.

4 (856). **L. scoparium** (Pall. ex Willd.) Stankov, V 1948, Опред. высш. раст. европ. части СССР: 741; Клоков, 1949, в Гроссг. Опред. раст. Кавк.: 594; Цвел. 1996,