

Описан из Дагестана. *Typus*: «Prov. Dagestan, distr. Kaitag[o]-Tabasaran pr. Baschli, in declivitat. meridional argilloso m. Dashavan-dag, 1500', 9 VII 1898, Th. Alexeenko» (LE!).

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК**: Ассо-Арг. (сев.).

Эндемик.

Отличается прицветниками, стеблями, а обычно и листьями по всей поверхности коротко, но густо опушенными. Наиболее типичны образцы из Караногайских степей и полупустынь.

4 (146). **Limonium** Mill., nom. cons.

Sect. 1. **Platyhymenium** (Boiss.) Lincz.

1 (853). **L. fischeri** (Trautv.) Lincz. 1952, Фл. СССР, 18: 427; Прилипко, 1957, Фл. Азерб. 7: 55; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 193. — *Statice fischeri* Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2: 481. — *Limonium nudum* auct. non (Boiss. et Buhse) Kuntze: Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 594.

Описан из Нахичевани. *Typus*: «Alindshi-tschai, 1871, № 30, G. Radde» (LE!, cum isotуро).

ВЗ: Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Нах.

Эндемик?

Описанный с Эльбурса в Иране близкий вид *L. nudum* отличается более крупными внутренними прицветниками и более многоцветковыми колосками.

Sect. 2. **Limonium**

2 (854). **L. gmelinii** (Willd.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 436; Rech. f. a. Schiman-Czeika, 1974, in Rech. f. Fl. Iran. 108: 6; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 167. — *Statice gmelinii* Willd. 1798, Sp. Pl. 1: 1524. — *S. glauca* Willd. ex Schult. 1820, in Roem. et Schult. Syst. Veg. 6: 799.

Описан, вероятно, с юго-востока европейской части России (по протологу — «in Sibiria»). ? *Isotуро*: «*Statice Gmelinii* W. Herb. Fischer» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб. (близ устья Кубани), З. Ставро. (сев.); **ВП**: В. Ставро. (близ сел. Ачикулак).

Юго-Вост. (Крым), Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. (Иран), Сев. (юг), Ср., Центр. Азия.

3 (855). **L. tomentellum** (Boiss.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 396; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 440; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 594; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 193; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 167. — *Statice tomentella* Boiss. 1848, in DC. Prodr. 12: 645. — *S. gmelinii* Willd. subsp. *tomentella* (Boiss.) Wangerin, 1912, Zeitschr. Naturwiss. 82: 443.

Описан из Нижнего Поволжья и «Сибири» («In deserto Wolgensi, Sibiria»).

ВП: Тер.-Кум. (сев.-вост.), Тер.-Сулак. (сев.).

Юго-Вост. (Присивашье), Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-зап.), Ср. (сев.-зап.) Азия.

4 (856). **L. scoparium** (Pall. ex Willd.) Stankov, V 1948, Опред. высш. раст. европ. части СССР: 741; Клоков, 1949, в Гроссг. Опред. раст. Кавк.: 594; Цвел. 1996,

Фл. Вост. Евр. 9: 166; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 437. — *Statice scoparia* Pall. ex Willd. 1798, Sp. Pl. 1: 1524; Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 248. — *S. meyeri* Boiss. 1848, in DC. Prodr. 12: 645. — *S. gmelinii* Willd. var. *laxiflora* Boiss. 1848, l. c.: 646. — *S. obovata* Ledeb. 1849, Fl. Ross. 3, 1: 468. — *Limonium meyeri* (Boiss.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 439; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 192; Rech. f. a. Schiman-Czeika, 1974, in Rech. f. Fl. Iran. 108: 6. — *L. obovatum* (Ledeb.) Kuntze, 1891, l. c.: 395. — *Statice laxiflora* (Boiss.) Novopokr. 1932, Изв. Главн. бот. сада АН СССР, 30: 239, in adnot. — *Limonium neoscoparium* Клоков, 1958, Фл. УРСР, 8: 525.

Описан, вероятно, из окр. Астрахани (по протологу — «in Sibiria»). *Л е с т о - т у р у s* (Tzvelev, hoc loco): «Kissilagatsch, Caucasus, № 2882, leg. Hohenacker» (LE!, cum isotypis 2).

ЗП; ВП; ЦК; ВК; СЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗ; Т.

Юго-Вост. (вост.), Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

Имеет немного более густые соцветия и немного более крупные чашечки по сравнению с типичным *L. scoparium*. Такие образцы более обычны в Закавказье, и к ним принадлежат также тип *Statice obovata* («Persia, Lencoran, leg. Hansen. Herb. Ledebour» — LE!), имеющий не вполне нормально развитое соцветие, и тип *Limonium neoscoparium* из окрестностей Гянджи в Азербайджане («Prov. Elisabethopol, distr. Aresh, in campis argillosis circa Geok-tapa, IX 1909, A. Schelkownikow. Herb. Fl. Cauc. № 95» — KW!). Подобные популяции могут быть выделены в качестве разновидности — **L. scoparium** var. **meyeri** (Boiss.) Tzvel. comb. et stat. nov. (*Statice meyeri* Boiss. l. c.: 645). Лектотип *Statice laxiflora* (по протологу: «In Tauria, Rossia australi ad Wolgam et gub. Cherson, ad oras orientales maris Caspii») еще не выбран.

5 (857). **L. platyphyllum** Lincz. 1964, Новости сист. высш. раст. 1: 266; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 166; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 437. — *Statice latifolia* Sm. 1791, Trans. Linn. Soc. London, 1: 250. — *Limonium latifolium* (Sm.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395, non Moench, 1794; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 442; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 193.

Описан из Ростовской области (близ устья Дона). *Т у р у s*: «Tanain prope opp. Azow, leg. Gerber» (K).

ЗП; ВП; ЦК: Малк.; **ВК; СЗЗ; ЗЗ:** Инг.-Рион. (сев.).

Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия (сев.).

6 (858). **L. sareptanum** (A. K. Becker) Gams, 1927, in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5, 3: 1880; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 446; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 194, in adnot.; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 168; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 437. — *Statice sareptana* A. K. Becker, 1858, Bull. Soc. Nat. Moscou, 30, 1: 12, 60.

Описан из окр. Волгограда. *Т у р у s*: «Sarepta, leg. Becker» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб. (Таманский п-ов), З. Ставр. (сев.).

Юго-Вост. (вост.), Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-зап.), Ср. (сев.-зап.) Азия.

7 (859). **L. caspium** (Willd.) Gams, 1927, in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5, 3: 1880; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 449; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 193; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 168; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 437. — *Statice caspia* Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 1: 336, in adnot.

Описан из Прикаспия («in Rossia australi provinciis Caucasico-Caspicis»). Ту р u s: «Regio caspica» (В).

ЗП; ВП; ВК.

Юго-Вост. (вост.), Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

8 (860). **L. kimmericum** (Lipsky) Klokov, 1958, Фл. УРСР, 8: 527. — *Statice caspia* Willd. var. *kimmerica* Lipsky, 1902, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 219.

Описан с черноморского побережья. Ту р u s: «Кубанская обл., Анапа, 14 VII 1891, В. Липский» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб. (Таманский п-ов); **СЗЗ.**

Юго-Вост. Европа (вост. Крым)

От очень близкого предыдущего вида отличается толстоватыми стеблями и ветвями при небольших (10–25 см выс.) общих размерах, более крупными (3.8–4.3, а не 2.5–3.5 мм дл.) прицветниками и более крупными (4–5, а не 3–3.5 мм дл.), в нижней части прижато-волосистыми чашечками.

Sect. 3. **Sarcophyllum** (Boiss.) Lincz.

9 (861). **L. suffruticosum** (L.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 396; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 458; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 194; Rech. f. a. Schiman-Czeika, 1974, in Rech. f. Fl. Iran. 108: 11; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 169. — *Statice suffruticosa* L. 1753, Sp. Pl.: 276.

Описан из Сибири («In Sibiria»).

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин. (близ морского побережья); **ВЗ:** Ширв. (близ морского побережья).

Вост. (юго-вост.) Европа; Сев. (юго-зап.), Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

10 (862). **L. kobstanicum** Tzvel. sp. nova. — Suffruticulus 15–35 cm altus, spiculas excluso glaber, canescenti-viridis, caudice valde ramoso. Caules ramosi, in dimidio inferiore foliati. Folia oblanceolata, versus basin sensim angustata et membranaceo auriculata, paulo carnosa et punctato-glandulosa. Flores in numero 5–20 in fasciculos densos congesti. Bracteolae 0.3–0.8 mm lt., subcoriaceae, sed prope marginem membranaceae. Bracteola major ovata, 4–5 mm lg., dorso dense, sed breviter pilosa. Calyx ca. 5 mm lg., secus nervos pubescens, quinquelobatus, lobis albidis, 1–1.5 mm lg. Flores 1.5–2 mm lg. Antherae 0.7–0.8 mm lg. — Полукустарничек 15–30 см выс., исключая колоски голый, серовато-зеленый, с сильно разветвленным каудексом. Стебли ветвистые, в нижней половине облиственные. Листья обратнolanцетные, к основанию постепенно суженные и с перепончатыми ушками, немного мясистые и точечно-железистые. Цветки в числе 5–20 собранные густыми пучками. Прицветнички 0.3–0.8 мм шир., почти кожистые, но близ края перепончатые. Наиболее крупный прицветничек яйцевидный, 4–5 мм дл., на спинке густо, но коротко волосистый. Чашечка около 5 мм дл., вдоль жилок опушенная, пятилопастная, с беловатыми лопастями 1–1.5 мм дл. Цветки 1.5–2 мм дл. Пыльники 0.7–0.8 мм дл.

Ту р u s: «Azerbajdzhan, Kobstan, Kaczumkau, 8 X 1954, An. Fedorov» (LE!, cum isotypis 2).

A f f i n i t a s. A specie proxima — *L. suffruticosum* (L.) Kuntze bracteola inferiore ca. 4.5 (non ca. 3.2) mm lg., dorso dense, sed breviter pilosa differt. A specie alia — *L. carnosum* (Boiss.) Kuntze foliis basi auriculatis facile differt. — От наиболее близкого вида — *L. suffruticosum* (L.) Kuntze — отличается нижним прицветничком около 4.5 (а не 3.2) мм дл., на спинке густо, но коротко волосистым. От другого вида — *L. carnosum* (Boiss.) Kuntze — легко отличается листьями у основания с ушками.

БК: Ман.-Самур. (юг), Кубин. (зап.); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (вост.), Ширв. (сев.-зап.).
Эндемик.

В отличие от предыдущего вида, приурочен не к равнинным, часто приморским солончакам, а к каменистым и мелкоземистым склонам низкогорий восточной оконечности Большого Кавказа. Впервые он был найден Ф. Н. Алексеенко («Fl. Cauc. № 61, 63 et 9441. Gub. Baku, distr. Schemacha, ad fl. Czikal-czai, inter fl. Alty-agacz et Schichlar, in argillosis siccis, 2600 ft, 25 VII 1900, F. Alexeenko» — LE!).

11 (863). **L. carnosum** (Boiss.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 460; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 194; Rech. f. a. Schiman-Czeika, 1974, in Rech. f. Fl. Iran. 108: 13.

Описан из северо-западного Ирана (окр. Тебриза).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (Иран).

Внешне очень сходен с предыдущими видами, но перепончатые ушки у основания листьев не развиты.

5 (147). **Linczevskia** Tzvel. gen. nov.

— *Statice* L. sect. *Pterocladus* Boiss. 1848, in DC. Prodr. 12: 635, non *Pterocladis* Lamb. ex G. Don, 1839, nec *Pterocladon* Hook. f. 1867.

Л е с т о т и п у с: *L. sinuata* (L.) Tzvel.

1 (864). **L. sinuata** (L.) Tzvel. comb. nova. — *Statice sinuata* L. 1753, Sp. Pl.: 276. — *Limonium sinuatum* (L.) Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 6; Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 593; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 419; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 192; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 169.

Описан из Средиземноморья.

ЗЗ: Адж. (одичавшее); в культуре в других районах.

Южн., Юго-Вост. (Крым), Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

Мы считаем, что этот оригинальный вид, широко введенный в культуру в качестве декоративного растения (особенно для сухих букетов), заслуживает выделения в особый род. В Иране известен еще один вид этого рода — **L. thouinii** (Viv.) Tzvel. comb. nova (*Statice thouinii* Viv. 1802, Elench. Pl.: 34. — *Limonium thouinii* (Viv.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 396).

6 (148). **Limoniopsis** Lincz.

1 (865). **L. owerinii** (Boiss.) Lincz. 1952, Фл. СССР, 18: 377, 745; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 194. — *Statice owerinii* Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 870. — *Limonium owerinii* (Boiss.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 396; Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 594.