

A f f i n i t a s. A specie proxima — *L. suffruticosum* (L.) Kuntze bracteola inferiore ca. 4.5 (non ca. 3.2) mm lg., dorso dense, sed breviter pilosa differt. A specie alia — *L. carnosum* (Boiss.) Kuntze foliis basi auriculatis facile differt. — От наиболее близкого вида — *L. suffruticosum* (L.) Kuntze — отличается нижним прицветничком около 4.5 (а не 3.2) мм дл., на спинке густо, но коротко волосистым. От другого вида — *L. carnosum* (Boiss.) Kuntze — легко отличается листьями у основания с ушками.

**БК:** Ман.-Самур. (юг), Кубин. (зап.); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (вост.), Ширв. (сев.-зап.).  
Эндемик.

В отличие от предыдущего вида, приурочен не к равнинным, часто приморским солончакам, а к каменистым и мелкоземистым склонам низкогорий восточной оконечности Большого Кавказа. Впервые он был найден Ф. Н. Алексеенко («Fl. Cauc. № 61, 63 et 9441. Gub. Baku, distr. Schemacha, ad fl. Czikal-czai, inter fl. Alty-agacz et Schichlar, in argillosis siccis, 2600 ft, 25 VII 1900, F. Alexeenko» — LE!).

11 (863). **L. carnosum** (Boiss.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 460; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 194; Rech. f. a. Schiman-Czeika, 1974, in Rech. f. Fl. Iran. 108: 13.

Описан из северо-западного Ирана (окр. Тебриза).

**ЮЗ:** Нах.

Юго-Зап. Азия (Иран).

Внешне очень сходен с предыдущими видами, но перепончатые ушки у основания листьев не развиты.

#### 5 (147). **Linczevskia** Tzvel. gen. nov.

— *Statice* L. sect. *Pterocladus* Boiss. 1848, in DC. Prodr. 12: 635, non *Pterocladis* Lamb. ex G. Don, 1839, nec *Pterocladon* Hook. f. 1867.

Л е с т о т y п u s: *L. sinuata* (L.) Tzvel.

1 (864). **L. sinuata** (L.) Tzvel. comb. nova. — *Statice sinuata* L. 1753, Sp. Pl.: 276. — *Limonium sinuatum* (L.) Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 6; Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 593; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 419; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 192; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 169.

Описан из Средиземноморья.

**ЗЗ:** Адж. (одичавшее); в культуре в других районах.

Южн., Юго-Вост. (Крым), Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

Мы считаем, что этот оригинальный вид, широко введенный в культуру в качестве декоративного растения (особенно для сухих букетов), заслуживает выделения в особый род. В Иране известен еще один вид этого рода — **L. thouinii** (Viv.) Tzvel. comb. nova (*Statice thouinii* Viv. 1802, Elench. Pl.: 34. — *Limonium thouinii* (Viv.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 396).

#### 6 (148). **Limoniopsis** Lincz.

1 (865). **L. owerinii** (Boiss.) Lincz. 1952, Фл. СССР, 18: 377, 745; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 194. — *Statice owerinii* Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 870. — *Limonium owerinii* (Boiss.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 396; Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 594.