

A f f i n i t a s. A specie proxima — *L. suffruticosum* (L.) Kuntze bracteola inferiore ca. 4.5 (non ca. 3.2) mm lg., dorso dense, sed breviter pilosa differt. A specie alia — *L. carnosum* (Boiss.) Kuntze foliis basi auriculatis facile differt. — От наиболее близкого вида — *L. suffruticosum* (L.) Kuntze — отличается нижним прицветничком около 4.5 (а не 3.2) мм дл., на спинке густо, но коротко волосистым. От другого вида — *L. carnosum* (Boiss.) Kuntze — легко отличается листьями у основания с ушками.

**БК:** Ман.-Самур. (юг), Кубин. (зап.); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (вост.), Ширв. (сев.-зап.).  
Эндемик.

В отличие от предыдущего вида, приурочен не к равнинным, часто приморским солончакам, а к каменистым и мелкоземистым склонам низкогорий восточной оконечности Большого Кавказа. Впервые он был найден Ф. Н. Алексеенко («Fl. Cauc. № 61, 63 et 9441. Gub. Baku, distr. Schemacha, ad fl. Czikal-czai, inter fl. Alty-agacz et Schichlar, in argillosis siccis, 2600 ft, 25 VII 1900, F. Alexeenko» — LE!).

11 (863). **L. carnosum** (Boiss.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 460; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 194; Rech. f. a. Schiman-Czeika, 1974, in Rech. f. Fl. Iran. 108: 13.

Описан из северо-западного Ирана (окр. Тебриза).

**ЮЗ:** Нах.

Юго-Зап. Азия (Иран).

Внешне очень сходен с предыдущими видами, но перепончатые ушки у основания листьев не развиты.

#### 5 (147). **Linczevskia** Tzvel. gen. nov.

— *Statice* L. sect. *Pterocladus* Boiss. 1848, in DC. Prodr. 12: 635, non *Pterocladis* Lamb. ex G. Don, 1839, nec *Pterocladon* Hook. f. 1867.

Л е к т о т y п u s: *L. sinuata* (L.) Tzvel.

1 (864). **L. sinuata** (L.) Tzvel. comb. nova. — *Statice sinuata* L. 1753, Sp. Pl.: 276. — *Limonium sinuatum* (L.) Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 6; Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 593; Линч. 1952, Фл. СССР, 18: 419; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 192; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 169.

Описан из Средиземноморья.

**ЗЗ:** Адж. (одичавшее); в культуре в других районах.

Южн., Юго-Вост. (Крым), Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

Мы считаем, что этот оригинальный вид, широко введенный в культуру в качестве декоративного растения (особенно для сухих букетов), заслуживает выделения в особый род. В Иране известен еще один вид этого рода — **L. thouinii** (Viv.) Tzvel. comb. nova (*Statice thouinii* Viv. 1802, Elench. Pl.: 34. — *Limonium thouinii* (Viv.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 396).

#### 6 (148). **Limoniopsis** Lincz.

1 (865). **L. owerinii** (Boiss.) Lincz. 1952, Фл. СССР, 18: 377, 745; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 194. — *Statice owerinii* Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 870. — *Limonium owerinii* (Boiss.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 396; Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 594.

Описан из Дагестана. Т у р и с: «Вершина хребта над р. Чиркат, сухой выгон с кустарником, 26 VII 1861, Оверин» (LE!).

**ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.

?Юго-Зап. Азия (верховья Евфрата).

Вероятно, является эндемиком Дагестана.

#### 7 (149). *Psylliostachys* (Jaub. et Spach) Nevski

1 (866). **P. spicata** (Willd.) Nevski, 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 4: 314; Рожкова, 1952, Фл. СССР, 18: 471; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 195; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 169. — *Statice spicata* Willd. 1787, Sp. Pl. 1: 1532. — *Limonium spicatum* (Willd.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 396; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 593.

Описан из Дагестана. Т у р и с: «Reg. Caspia, ad pag. Melikent et Derbent, Gmelin» (В?).

**ВП:** Тер.-Кум. (низовья Кумы), Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Вост. (Крым), Вост. (низовья Кумы) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

### Subclassis Hamamelididae

### Superordo Hamamelidanae

### ORDO 15. HAMAMELIDALES

Fam. 48. **HAMAMELIDACEAE** R. Br., nom. cons.\*

Subfam. **HAMAMELIDOIDEAE** Burnett

#### 1 (150). *Parrotia* C. A. Mey.

1 (867). **P. persica** (DC.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 46; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 288; Прилипко, 1953, Фл. Азерб. 4: 368; Wendelbo, 1968, in Rech. f. Fl. Iran. 53: 1; Zohary et al. 1980, Consp. fl. Or. 1: 69. — *Hamamelis persica* DC. 1830, Prodr. 4: 268.

Описан из Талыша («in Persiae prov. Lenckeran legit cl. Hansen»).

**ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Габалинский р-н, окр. сел. Чухур-Габала); **Т:**

За пределами мест естественного произрастания широко распространен в культуре в Закавказье; выращивается также в Пятигорске и других городах Сев. Кавказа.

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран). Культивируется в некоторых внетропических странах.

Интродуцирован на Кавказе в прошлом веке.

---

\* Н. Н. Имханицкая.