

Описан из Дагестана. Т у р и с: «Вершина хребта над р. Чиркат, сухой выгон с кустарником, 26 VII 1861, Оверин» (LE!).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.

?Юго-Зап. Азия (верховья Евфрата).

Вероятно, является эндемиком Дагестана.

7 (149). *Psylliostachys* (Jaub. et Spach) Nevski

1 (866). **P. spicata** (Willd.) Nevski, 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 4: 314; Рожкова, 1952, Фл. СССР, 18: 471; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 195; Цвел. 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 169. — *Statice spicata* Willd. 1787, Sp. Pl. 1: 1532. — *Limonium spicatum* (Willd.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 396; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 593.

Описан из Дагестана. Т у р и с: «Reg. Caspia, ad pag. Melikent et Derbent, Gmelin» (В?).

ВП: Тер.-Кум. (низовья Кумы), Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** ЮЗ: Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Вост. (Крым), Вост. (низовья Кумы) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

Subclassis Hamamelididae

Superordo Hamamelidanae

ORDO 15. HAMAMELIDALES

Fam. 48. **HAMAMELIDACEAE** R. Br., nom. cons.*

Subfam. **HAMAMELIDOIDEAE** Burnett

1 (150). *Parrotia* C. A. Mey.

1 (867). **P. persica** (DC.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 46; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 288; Прилипко, 1953, Фл. Азерб. 4: 368; Wendelbo, 1968, in Rech. f. Fl. Iran. 53: 1; Zohary et al. 1980, Consp. fl. Or. 1: 69. — *Hamamelis persica* DC. 1830, Prodr. 4: 268.

Описан из Талыша («in Persiae prov. Lenckeran legit cl. Hansen»).

ВЗ: Алаз.-Агрич. (Габалинский р-н, окр. сел. Чухур-Габала); **Т:**

За пределами мест естественного произрастания широко распространен в культуре в Закавказье; выращивается также в Пятигорске и других городах Сев. Кавказа.

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран). Культивируется в некоторых внетропических странах.

Интродуцирован на Кавказе в прошлом веке.

* Н. Н. Имханицкая.