

Fam. 49. **PLATANACEAE** T. Lestib., nom. cons.*

1 (151). **Platanus** L.

1 (868). **P. occidentalis** L. 1753, Sp. Pl.: 999; Палиб. 1939, Фл. СССР, 9: 279; Прилипко, 1963, Дендротл. Кавк. 3: 287.

Описан из Северной Америки.

ЗЗ: Туап.-Адл. (Сочи), Абх. (Сухум), Адж. (Батуми); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси); **ВЗ:** Ширв. (Баку). Культивируется в качестве декоративного растения.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Краснодар), З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб. (Майкоп); **ЦК:** В. Кум. (Пятигорск, Кисловодск), Малк. (Нальчик), В. Тер. (Владикавказ); **ВК:** Ассо-Арг. (Грозный), Ман.-Самур. (Махачкала) (Галушко, 1967: 193).

Сев. Америка (США: от Небраски и Техаса до атлант. побережья). Культивируется во многих внетропических странах.

Интродуцирован на Кавказе в прошлом веке.

2 (869). **P. orientalis** L. 1753, Sp. Pl.: 999. — *P. digitata* Gordon, 1872, Garden, 1: 572–573, non Unger, 1850; Палиб. 1939, Фл. СССР, 9: 276, табл. 16, рис. 2. — *P. orientalis* Dode, 1908, Bull. Soc. Dendrol. Fr. 7: 957. — *P. digitifolia* Palib. 1945, Бот. журн. 30, 2: 95; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 63; Прилипко, 1953, Фл. Азерб. 4: 376.

Описан из Юго-Восточной Анатолии и Средиземноморья.

ЦК: В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев.; **Т.** Широко культивируется как декоративное растение.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Краснодар), З. Ставр. (Ставрополь); **ЦК:** Малк. (Нальчик) (Галушко, 1967: 193); **ЮЗ:** Занг. (р. Цав, Цавская (Зангезурская) платановая роща), Мегр.-Зан., Ю. Караб. (р. Басутчай, Басутчайская платановая роща) (Прилипко, 1953: 376; Мулкиджанян, 1958: 11; Сафаров, 1966: 877; Файвуш, 2010: 383).

Юго-Вост. Европа (юг); Средиз. (к вост. от Италии); Юго-Зап. Азия.

3 (870). **P. × hispanica** Mill. ex Münchh. 1770, Hausvater, 5, 1: 229. — *P. × hybrida* Brot. 1805, Fl. Lusit. 2: 487; Yalt. 1982, Fl. Turk. 7: 656. — *P. cuneata* Willd. 1805, Sp. Pl. 4: 473; Палиб. 1939, Фл. СССР, 9: 275. — *P. × acerifolia* (Aiton) Willd. 1805, l. c.: 474; Мулк. 1958, Фл. Арм. 3: 19. — *P. orientalis* L. var. *β. acerifolia* Aiton, 1789, Hort. Kew. ed. 1, 3: 364. = *P. occidentalis* × *P. orientalis*.

Описан по культивированным экземплярам.

Указан для **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Гроссгейм, 1949: 63, sub nom. *P. cuneata*); **ЗЗ:** Адж. (Батуми) (Манджавидзе, 1968: 61, sub nom. *P. × acerifolia*); **ЮЗ:** Ерев. (Мулкиджанян, 1953: 12, sub nom. *P. × acerifolia*).

Атл., Центр. Европа; Средиз.; Ср. Азия.

* Н. Н. Имханицкая.