

А. И. Галушко (1978) указывает для Бело-Лабинского района *E. x tackayi* (Newm.) Brichan (*E. x trachyodon* (A. Br.) W. D. J. Koch; *E. hyemale* x *E. variegatum*). В изученных гербариях все кавказские образцы, этикетированные как *E. x trachyodon*, оказались *E. variegatum*.

## Phylum Polypodiophyta

### Classis Polypodiopsida

### Subclassis Osmundidae

#### Ordo 1. Osmundales

##### Fam. 5. Osmundaceae Bercht. et J. Presl\*

#### 1.(8). Osmunda L.

1.(21). *O. regalis* L. 1753, Sp. Pl.: 1065.

Описан по материалам из Европы и Северной Америки (Виргиния).

**ЗЗ** (на приморских низменностях, болотах).

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция), Южн. Азия; Южн. Африка; Сев., Центр., Южн. Америка.

### Subclassis Polypodiidae

#### Ordo 2. Pteridales

##### Fam. 6. Pteridaceae Reichenb.\*

#### 1.(9). Pteris L.

1.(22). *P. cretica* L. 1767, Mantissa : 130.

Описан с о-ва Крит.

**ЗЗ; Т.**

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Сирия, Иран), Южн. Азия; Центр. Африка.

2.(23). *P. vittata* L. 1753, Sp. Pl.: 1074.

Описан из Китая.

**ЗЗ:** Адж. (натурализовался в Батумском бот. саду) (Дмитриева, 1990 : 18).

Указан для **ВЗ:** Ширв. (Баку) (Аскеров, 1972а : 62, 1977в : 51).

Средиз.; Юго-Зап. (Турция), Юго-Вост. Азия; Центр. Африка.

#### 2.(10). Pteridium Gled. ex Scop.

1.(24). *P. aquilinum* (L.) Kuhn, 1879, in Kersten, Reise Ost. Afr. Bot. 3, 3 : 11. — *Pteris aquilina* L. 1753, Sp. Pl. : 1075.

Описан из Европы.

**ЗК; ЦК:** Малк.; **ВК; ЗЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич.

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987 : 9); В. Тер. (Демурова, 1972 : 147; Комжа, 2001 : 112).

\* Г. Л. Кудряшова (Кудряшова, 2000)