

## Superordo Buxanae

### ORDO 16. BUXALES

Fam. 50. **BUXACEAE** Dumort., nom. cons.\*

Trib. **Buxeeae** Dumort.

1 (152). **Buxus** L.

1 (871). **B. sempervirens** L. 1753, Sp. Pl.: 983.

Описан из Южной Европы.

1а. **B. sempervirens** L. subsp. **sempervirens**. — *B. colchica* Pojark. 1947, Реф. науч.-исслед. работ за 1945 г.: Отд. биол. наук АН СССР: 7; Поярк. 1949, Фл. СССР, 14: 505.

**ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Шхиян, 1962: 98; Галушко, 1980: 206); **ЮЗЗ:** Месх. (Шхиян, 1964: 231).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

1б. **B. sempervirens** L. subsp. **hyrcana** (Pojark.) Takht. 1972, Бот. журн. 57, 2: 250. — *B. hyrcana* Pojark. 1947, Реф. науч.-исслед. работ за 1945 г.: Отд. биол. наук АН СССР: 7; Поярк. 1949, Фл. СССР, 14: 509.

Описан из северного Ирана («область лесов Гирканской провинции, простирающихся от Ленкорани до Астрабада»). Тур u s: «Persia, Prov. Ghilan, inter Amabesch et Losiabad, in nemorosis ripariis ad fl. Schommol, 15 VII 1902, Th. Alexeenko» (LE!).

**T.**

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

## Superordo Faganae

### ORDO 17. FAGALES

Fam. 51. **FAGACEAE** Dumort., nom. cons.\*

Subfam. 1. **FAGOIDEAE** C. Koch

1 (153). **Fagus** L.

1 (872). **F. orientalis** Lipsky, 1898, Тр. Петерб. бот. сада, 14: 300; Меницкий и Цвел. 2004, Фл. Вост. Евр. 11: 53. — *F. sylvatica* L. var. *macrophylla* Hohen. ex A. DC. 1838, Bull. Soc. Nat. Moscou, 11: 259. — *F. sylvatica* var. *asiatica* DC. 1868, Prodr. 16, 2: 119. — *F. asiatica* (DC.) H. J. P. Winkl. 1901, Pflanzengeogr. Stud. Buchenwald.: 5. — *F. hohenackeriana* Palib. 1908, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 8: 378; Гросср. 1930, Фл. Кавк. 2: 21. — *F. pyramidalis* Litv. 1916, Тр. Бот. муз. Акад. наук, 15:

\* Ю. Л. Меницкий (Меницкий, 2002).

125. — *F. sylvatica* subsp. *orientalis* (Lipsky) Greuter et Burdet, 1981, Willdenowia, 11, 2: 279.

Описан с Кавказа. Lectotypus (Меницкий, Цвелёв, 2004: 53; Фёдоров, in sched.): «Сухум, окр. Гудауты, 13 VIII 1895, В. Л[ипский]» (LE!).

**ЗП:** 3. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Мегр.-Зан.; **Т.**

Юго-Вост. Европа; Средиз. (вост.); Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, сев. Иран).

## Subfam. 2. CASTANEOIDEAE Oerst.

### Trib. 1. **Castaneeae** Dumort.

#### 2 (154). **Castanea** Mill.

1 (873). **C. sativa** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 1. — *Fagus castanea* L. 1753, Sp. Pl.: 997. — *Castanea vulgaris* Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 708. — *C. vesca* Gaertn. 1788, Fruct. Sem. Pl. 1: 181.

Описан из Италии.

**ЗК:** Бело-Лаб., **ВК:** Кубин. (в культуре); **СЗЗ** («Circassia»); **ЗЗ; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос. (Сурамский перевал, Боржоми, Южная Осетия); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв. (в культуре).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

### Trib. 2. **Querceae** Dumort.

#### 3 (155). **Quercus** L.

##### Sect. 1. **Quercus**

##### Subsect. 1. **Ponticae** (Stef.) A. Camus

1 (874). **Q. pontica** C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 319; Меницкий, 1984, Дубы Азии: 31, рис. 4.

Описан из Турции (Лазистан). Turus: «Im Gaue Risa auf Porphyr, с. 4000' hoch» (В?).

**ЗЗ:** Абх. (к югу от бассейна Бзыби), Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.

Юго-Зап. Азия (Турция: от Трабзона до сев.-вост. границы).

##### Subsect. 2. **Quercus**

2 (875). **Q. robur** L. 1753, Sp. Pl.: 996; Меницкий, 1984, Дубы Азии: 43, рис. 17. — *Q. pedunculata* Ehrh. 1790, Beitr. Naturk. 5: 161.

Описан из Европы.

2а. **Q. robur** L. subsp. **robur**. — *Q. robur* subsp. *pedunculata* (Ehrh.) A. DC. var. *vulgaris* A. DC. 1864, in DC. Prodr. 16, 2: 4, p. p. — *Q. pedunculata* Ehrh. var. *typica* Medw. 1908, Дубы Кавк.: 1. — *Q. imeretina* Steven ex Woronow, 1930, Ежегодн.