

Указания на распространение вида в **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Ладжанури) (Фомин, Воронов, 1911: 60; Гроссгейм, 1930: 19; Шхиян, 1964: 321) и **ВК**: Кубин. (Гроссгейм, 1930: 19) весьма сомнительны и не подтверждаются сборами и другими сводками (Гроссгейм, 1945: 47; Прилипка, 1952: 96).

Fam. 53. **CORYLACEAE** Mirb., nom. cons.\*

(*Betulaceae* subfam. *Carpinoideae* Rouy et *Coryloideae* Hook. f.: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 120)

1 (158). **Carpinus** L.

1 (891). **C. betulus** L. 1753, Sp. Pl.: 998. — *C. caucasica* Grossh. 1940, Изв. Азерб. фил. АН СССР, 5: 34; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 41.

Описан из Европы.

**ЗП**; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ**: Ерев., Дар., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ВП**: Тер.-Сулак.; **ЦЗ**: Лори; **ЮЗ**: Севан., Нах. (Гроссгейм, 1945: 41); для всех лесных районов Грузии, Армении и Азербайджана (Кемулариа-Натадзе, 1975: 29; Мулкиджанян, 1962: 398; Ахундов, 1952: 83).

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

2 (892). **C. × schuschaensis** Н. J. P. Winkl. 1904, in Engl. Pflanzenr. 19, 4, 61: 32; Бобр. 1936, Фл. СССР, 5: 257; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 40, pro sp. — *C. oxycarpa* Н. J. P. Winkl. 1904, l. c.: 31; Ахундов, 1952, Фл. Азерб. 3: 84, pro sp. — *C. × hybrida* Н. J. P. Winkl. 1904, l. c.: 40. — *C. grosseserrata* Н. J. P. Winkl. 1904, l. c.: 40, pro sp. — *C. geokezaica* Radde-Fom. 1929, Тр. физ.-мат. отд. АН УССР, 15, 1: 89.

Описан из Карабаха (Шуши). *Lectotypus* (Menitsky, hoc loco): «Prope castellum Schuscha, № 3462, Herb. K. Fr. Hohenacker» (LE!; syntypi: В, LE (№№ 3443, 3455)!, G-BOIS, W).

**ВК**: Ман.-Самур. (Магарамкент); **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **Т**.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

3 (893). **C. orientalis** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 3. — *C. duinensis* Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 2: 243, tab. 60. — *C. macrocarpa* Н. J. P. Winkl. 1904, in Engl. Pflanzenr. 19, 4, 61: 38; Ахундов, 1952, Фл. Азерб. 3: 87.

Описан из Турции («*Carpinus Orientalis folio minori fructu brevi. T[ournefort].* Сог. 40»).

**ЗК**: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: Ман.-Самур.; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**; **ЮЗЗ**: Месх.; **ЮЗ**: Ерев., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ВК**: Кубин. (Ахундов, 1952: 87); **ЦЗ**: Лори; **ЮЗ**: Занг. (Мулкиджанян, 1962: 400); для всех районов Грузии (Кемулариа-Натадзе, 1975: 30).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

\* Ю. Л. Меницкий.

2 (159). *Ostrya* Scop., nom. cons.

1 (894). *O. carpinifolia* Scop. 1772, Fl. Carn. ed. 2, 2: 244. — *Carpinus ostrya* L. 1753, Sp. Pl.: 998.

Описан из Италии.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 193); **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Кемулариа-Натадзе, 1975: 31).

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа, Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия).

3 (160). *Corylus* L.

1 (895). *C. avellana* L. 1753, Sp. Pl.: 998. — *C. egrissiensis* Kem.-Nath. 1978, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 35: 8.

Описан из Европы.

**ЗП;** **ВП:** В. Ставр.; **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агртч., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Занг.; **Т:**

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 43; Прилипко, 1952: 88); всех лесных районов Грузии (Кемулариа-Натадзе, 1975: 37) и Армении (Мулкиджаниян, 1962: 413).

Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, сев.-зап. Иран).

*C. egrissiensis* Kem.-Nath., описанный из Мингрелии (указан также для Абхазии, Сванетии и Аджарии), имеет глубоко рассеченные листочки обертки, приблизительно в 1.5 раза превышающие орех. Возможно, представляет переходную форму между *C. avellana* и *C. pontica* C. Koch.

2 (896). *C. pontica* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 329. — *C. avellana* L. var. *pontica* (C. Koch) H. J. P. Winkl. 1904, in Engl. Pflanzenr. 19, 4, 61: 47; Yalt. 1982, Fl. Turk. 7: 687. — *C. imeretica* Kem.-Nath. 1934, Тр. Тифл. бот. инст. 1: 111; Kem.-Nath. 1975, Фл. Груз. изд. 2, 3: 38.

Описан из Турции. Тур у s: «Auf der Nord-seite des pontischen Gebirges auf Augitporphyg bis zu 2500', Höhe [C. Koch]» (В?).

**ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Гроссгейм, 1945: 44; Кемулариа-Натадзе, 1975: 38, sub nom. *C. imeretica*).

Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

К этому виду очень близок *C. kachetica* Kem.-Nath. 1975, цит. соч.: 38, descr. georg., описанный из Пшавии по материалу, который мы не видели. По диагнозу этот вид отличается от *C. pontica* более тонкими, зелеными с обеих сторон листьями и более стянутой выше ореха плоской.

3 (897). *C. colurna* L. 1753, Sp. Pl.: 999. — *C. cervorum* Petrov, 1936, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 45, 2: 119; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 43. — *C. iberica* Wittm. ex Kem.-Nath. 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 6: 11; Kem.-Nath. 1975, Фл. Груз. 3: 34; Гроссг. 1945, цит. соч.: 42.

Описан из Турции («Habitat Byzantii»).

**ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб. (Галушко, 1978: 192, sub nom. *C. iberica*; Танфильев, Кононов, 1987: 31); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Шхиян, 1964: 318; Кемулариа-Нагадзе, 1975: 34, sub nom. *C. iberica*).

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

Л. М. Кемулариа-Нагадзе (1938) считает, что на Кавказе *C. colurna* замещается местными видами — *C. iberica* в Грузии (с толстой мясистой плюской, рассеченной на лопасти выше верхушки ореха, красными пыльниками, красноватой древесиной и более темной корой) и *C. cervorum* в Восточном Закавказье (с более высокой трубчатой плюской и более толстыми ее листочками, а также гетерофилией). Едва ли все эти признаки устойчивы для характеристики географических рас. Ею же описаны гибриды этого вида с *C. avellana*: *C. × fominii* Kem.-Nath. 1938, цит. соч.: 15 (*C. avellana* × *C. iberica*) и *C. × gudarethica* Kem.-Nath. 1938, цит. соч.: 17 (*C. iberica* × *C. avellana*).

4 (898). **C. colchica** Albov, 1895, Mat. фл. Колх.: 219. — *C. abchasica* Kem.-Nath. 1978, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 35: 3.

Описан из западной Грузии. *Syn t y p i*: «Hab. in Mingrelia, ad rupes calcareas montium Dzhwari et Migaria (supra pagum Kurdzu), alt. 1900–2000 m (1893, №№ 500, 501, N. A[lbov])» (G?).

**ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.

Эндемик.

5 (899). **C. maxima** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 2.

Описан по культивированным образцам.

**ЗЗ.** Культивируется как орехоплодное растение.

Указан как одичавшее в **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1990, 1: 182).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

## Superordo Juglandanae

### ORDO 19. JUGLANDALES

Fam. 54. **JUGLANDACEAE** DC. ex Perleb, nom. cons.\*

Subfam. 1. **PLATYCARYOIDEAE** W. E. Manning

1 (161). **Platycarya** Siebold et Zucc.

1 (900). **P. strobilacea** Siebold et Zucc. 1843, Abh. Akad. Wiss. (München), 3, 3: 742, tab. 5; А. В. Васил. 1961, Дендрофл. Кавк. 2: 80.

Описан из Японии.

Указан для **ЦК:** В. Тер. (Владикавказ); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Сочи) (Карпун, 2003: 48), Абх. (Сухум), Адж. (Батуми); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси) (Гоголишвили, Лория, 1989: 48). Культивируют как декоративное растение в садах и парках, дает самосев.

\* И. В. Таганов.