

Указания на распространение вида в **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Ладжанури) (Фомин, Воронов, 1911: 60; Гроссгейм, 1930: 19; Шхиян, 1964: 321) и **ВК**: Кубин. (Гроссгейм, 1930: 19) весьма сомнительны и не подтверждаются сборами и другими сводками (Гроссгейм, 1945: 47; Прилипка, 1952: 96).

Fam. 53. **CORYLACEAE** Mirb., nom. cons.*

(*Betulaceae* subfam. *Carpinoideae* Rouy et *Coryloideae* Hook. f.: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 120)

1 (158). **Carpinus** L.

1 (891). **C. betulus** L. 1753, Sp. Pl.: 998. — *C. caucasica* Grossh. 1940, Изв. Азерб. фил. АН СССР, 5: 34; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 41.

Описан из Европы.

ЗП; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ**: Ерев., Дар., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ВП**: Тер.-Сулак.; **ЦЗ**: Лори; **ЮЗ**: Севан., Нах. (Гроссгейм, 1945: 41); для всех лесных районов Грузии, Армении и Азербайджана (Кемулариа-Натадзе, 1975: 29; Мулкиджанян, 1962: 398; Ахундов, 1952: 83).

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

2 (892). **C. × schuschaensis** Н. J. P. Winkl. 1904, in Engl. Pflanzenr. 19, 4, 61: 32; Бобр. 1936, Фл. СССР, 5: 257; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 40, pro sp. — *C. oxycarpa* Н. J. P. Winkl. 1904, l. c.: 31; Ахундов, 1952, Фл. Азерб. 3: 84, pro sp. — *C. × hybrida* Н. J. P. Winkl. 1904, l. c.: 40. — *C. grosseserrata* Н. J. P. Winkl. 1904, l. c.: 40, pro sp. — *C. geokezaica* Radde-Fom. 1929, Тр. физ.-мат. отд. АН УССР, 15, 1: 89.

Описан из Карабаха (Шуши). *Lectotypus* (Menitsky, hoc loco): «Prope castellum Schuscha, № 3462, Herb. K. Fr. Hohenacker» (LE!; syntypi: В, LE (№№ 3443, 3455)!, G-BOIS, W).

ВК: Ман.-Самур. (Магарамкент); **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **Т**.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

3 (893). **C. orientalis** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 3. — *C. duinensis* Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 2: 243, tab. 60. — *C. macrocarpa* Н. J. P. Winkl. 1904, in Engl. Pflanzenr. 19, 4, 61: 38; Ахундов, 1952, Фл. Азерб. 3: 87.

Описан из Турции («*Carpinus Orientalis folio minori fructu brevi. T[ournefort].* Сог. 40»).

ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: Ман.-Самур.; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**; **ЮЗЗ**: Месх.; **ЮЗ**: Ерев., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ВК**: Кубин. (Ахундов, 1952: 87); **ЦЗ**: Лори; **ЮЗ**: Занг. (Мулкиджанян, 1962: 400); для всех районов Грузии (Кемулариа-Натадзе, 1975: 30).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

* Ю. Л. Меницкий.