

2 (159). *Ostrya* Scop., nom. cons.

1 (894). *O. carpinifolia* Scop. 1772, Fl. Carn. ed. 2, 2: 244. — *Carpinus ostrya* L. 1753, Sp. Pl.: 998.

Описан из Италии.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 193); **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Кемулариа-Натадзе, 1975: 31).

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа, Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия).

3 (160). *Corylus* L.

1 (895). *C. avellana* L. 1753, Sp. Pl.: 998. — *C. egrissiensis* Kem.-Nath. 1978, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 35: 8.

Описан из Европы.

**ЗП;** **ВП:** В. Ставр.; **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агртч., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Занг.; **Т:**

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 43; Прилипко, 1952: 88); всех лесных районов Грузии (Кемулариа-Натадзе, 1975: 37) и Армении (Мулкиджанян, 1962: 413).

Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, сев.-зап. Иран).

*C. egrissiensis* Kem.-Nath., описанный из Мингрелии (указан также для Абхазии, Сванетии и Аджарии), имеет глубоко рассеченные листочки обертки, приблизительно в 1.5 раза превышающие орех. Возможно, представляет переходную форму между *C. avellana* и *C. pontica* C. Koch.

2 (896). *C. pontica* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 329. — *C. avellana* L. var. *pontica* (C. Koch) H. J. P. Winkl. 1904, in Engl. Pflanzenr. 19, 4, 61: 47; Yalt. 1982, Fl. Turk. 7: 687. — *C. imeretica* Kem.-Nath. 1934, Тр. Тифл. бот. инст. 1: 111; Kem.-Nath. 1975, Фл. Груз. изд. 2, 3: 38.

Описан из Турции. Тур у s: «Auf der Nord-seite des pontischen Gebirges auf Augitporphyg bis zu 2500', Höhe [C. Koch]» (В?).

**ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Гроссгейм, 1945: 44; Кемулариа-Натадзе, 1975: 38, sub nom. *C. imeretica*).

Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

К этому виду очень близок *C. kachetica* Kem.-Nath. 1975, цит. соч.: 38, descr. georg., описанный из Пшавии по материалу, который мы не видели. По диагнозу этот вид отличается от *C. pontica* более тонкими, зелеными с обеих сторон листьями и более стянутой выше ореха плоской.

3 (897). *C. colurna* L. 1753, Sp. Pl.: 999. — *C. cervorum* Petrov, 1936, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 45, 2: 119; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 43. — *C. iberica* Wittm. ex Kem.-Nath. 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 6: 11; Kem.-Nath. 1975, Фл. Груз. 3: 34; Гроссг. 1945, цит. соч.: 42.

Описан из Турции («Habitat Byzantii»).