

Сев. Америка (Канада: от южн. Онтарио до Нью-Брансуика; США: от Миннесоты до Мэна на севере и от Арканзаса до Джорджии на юге). Культивируется в странах с влажным теплоумеренным климатом.

В местах совместного произрастания *J. cinerea* и *J. regia* возможно нахождение их гибрида *J. × quadrangulata* (Carrière) Rehder.

## Trib. 2. **Caryeae** Koidz. (*Hicorieae* W. E. Manning)

### 4 (164). **Carya** Nutt., nom. cons.

#### Sect. 1. **Carya**

1 (914). **C. glabra** (Mill.) Sweet, 1826, Hort. Brit. 1: 97; Дмитриева, 1961, Дендрофл. Кавк. 2: 105. — *Juglans glabra* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 5.

Описан с востока США (Виргиния).

Указан для **33**: Абх. (Сухум), Адж. (Батуми) (Дмитриева, 1961: 106; Гоголишвили, Лория, 1989: 43). Культивируется как декоративное растение в садах и парках.

Сев. Америка (Канада: юг Онтарио; США: от Иллинойса до Нью-Гемпшира на севере и от вост. Техаса до атлант. побережья на юге). Культивируется в странах с влажным субтропическим и умеренным климатом.

2 (915). **C. ovata** (Mill.) C. Koch, 1869, Dendrologie, 1: 598; Дмитриева, 1961, Дендрофл. Кавк. 2: 107. — *Juglans ovata* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 6.

Описан с востока США (Виргиния).

Указан для **33**: Туап.-Адл. (Сочи) (Карпун, 2003: 48), Абх. (Сухум), Инг.-Рион. (Зугдиди) (Гоголишвили, Лория, 1989: 44), Адж. (Батуми) (Дмитриева, 1961: 108; Гоголишвили, Лория, 1989: 44); **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос. (Тбилиси) (Гоголишвили, Лория, 1989: 44). Культивируется как декоративное растение в садах и парках.

Сев. Америка (Канада: юго-вост. Онтарио и юг Квебека; США: от Миннесоты до Мэна на севере и от вост. Техаса до Сев. Каролины на юге; сев.-вост. Мексика). Культивируется в странах с влажным субтропическим и умеренным климатом.

3 (916). **C. tomentosa** (Lam.) Nutt. 1818, Gen. North Amer. Pl. 2: 221. — *Juglans tomentosa* Lam. 1798, Encycl. Méth. Bot. 4: 504. — *J. alba* L. 1753, Sp. Pl.: 997, nom. ambig. rej. — *Carya alba* (L.) C. Koch, 1869, Dendrologie, 1: 596; Дмитриева, 1961, Дендрофл. Кавк. 2: 107; Конечн. 2004, Фл. Вост. Евр. 11: 101.

Описан из Северной Америки.

Указан для **3П**: Аз.-Куб. (Ростов-на-Дону); **33**: Туап.-Адл. (Сочи) (Карпун, 2003: 48); **33**: Абх. (Гагра, Сухум) (Гоголишвили, Лория, 1989: 44), Адж. (Батуми) (Дмитриева, 1961: 107; Гоголишвили, Лория, 1989: 44); **ВЗ**: Алаз.-Агр. (Гоголишвили, Лория, 1989: 44); Азербайджан (Т. С. Мамедов, личн. сообщ.). Культивируется как декоративное растение в садах, парках и уличных посадках.

Сев. Америка (США: от Айовы и Техаса до атлант. побережья). Культивируется в странах с влажным субтропическим и умеренным климатом.

Sect. 2. **Apocarya** DC.

4 (917). **C. cordiformis** (Wangenh.) C. Koch, 1869, *Dendrologie*, 1: 597; Дмитриева, 1961, *Дендрофл. Кавк.* 2: 105; Галушко, 1967, *Дерев. куст. Сев. Кавк.*: 91. — *Juglans cordiformis* Wangenh. 1787, *Beitr. Teut. Forstwiss.*: 25, tab. 10, fig. 25.

Описан с востока США (Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавэр).

Указан для **ЗП**: Аз.-Куб. (Ростов-на-Дону) (Карпун, 2003: 48), З. Ставр. (Ставрополь) (Галушко, 1967: 91); **ЦК**: В. Кум. (Пятигорск) (Галушко, 1967: 91; Карпун, 2003: 48), В. Тер. (Владикавказ) (Карпун, 2003: 48); **ЗЗ**: (Дмитриева, 1961: 105; Гоголишвили, Лория, 1989: 43; Карпун, 2003: 48); **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси) (Гоголишвили, Лория, 1989: 43); Азербайджана (Т. С. Мамедов, личн. сообщ.). Культивируется как декоративное растение в садах, парках и уличных посадках.

Сев. Америка (Канада: юг Онтарио и Квебека; США: от Миннесоты и Техаса до атлант. побережья). Культивируется в странах с влажным субтропическим и умеренным климатом. Натурализовался в Польше.

5 (918). **C. illinoensis** (Wangenh.) C. Koch, 1869, *Dendrologie*, 1: 593 («*illinoënsis*»). — *Juglans illinoensis* Wangenh. 1787, *Beitr. Teut. Forstwiss.*: 54, tab. 18, fig. 43. — *Juglans pecan* Marshall, 1785, *Arbust. Amer.*: 69. — *Carya pecan* (Marshall) Engl. et Graebn. 1902, in *Engl. Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, 3, App. 9: 19, nom. illeg., non (Walter) Nutt. 1842; Прилипко, 1952, *Фл. Азерб.* 3: 81; Дмитриева, 1961, *Дендрофл. Кавк.* 2: 103; Галушко, 1967, *Дерев. куст. Сев. Кавк.*: 90; Конечн. 2004, *Фл. Вост. Евр.* 11: 101; Askerov, 2011, *Azərbay. fl. konsp.*: 106.

Описан из США (Иллинойс).

Указан для **ЗП**: Аз.-Куб. (Ростов-на-Дону, Краснодар) (Галушко, 1967: 91, sub nom. *C. pecan*; Карпун, 2003: 48), З. Ставр. (Ставрополь) (Галушко, 1967: 91); **ЗК**: Бело-Лаб. (Майкоп, Гончарка) (Карпун, 2003: 48); **ЦК**: В. Кум. (Пятигорск) (Галушко, 1967: 91; Карпун, 2003: 48), В. Тер. (Мал. Кабарда); **ВК**: Ассо-Арг. (Грозный) (Галушко, 1967: 91); **ЗЗ**: Туап.-Адл. (Сочи) (Карпун, 2003: 48), от Абх. до Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси); **ВЗ**: Алаз.-Агр. (Гоголишвили, Лория, 1989: 44), Ширв. (Апшерон) (Mamedov, 2010: 230), Мург.-Муровд. (Иджеван, Ванадзор); **ЮЗ**: Ерев. (Ереван) (Аннотированный каталог..., 1985: 98, sub nom. *C. pecan*); **Т** (Прилипко, 1952: 81; Askerov, 2011: 106). Культивируется как орехоплодное и декоративное растение в садах, парках и уличных посадках, иногда дичает.

Сев. Америка (США: от Айовы и Кентукки на севере и до Техаса и Луизианы на юге; сев.-вост. Мексики). Широко культивируют в странах с влажным субтропическим и умеренным климатом. Натурализовался на Мальте.

В культуре известно много сортов и форм.

На Кавказе (в основном в **ЗЗ**) иногда культивируются и другие декоративные виды рода *Carya* (преимущественно североамериканские): *C. aquatica* (F. Michx.) Elliott, *C. laciniosa* (F. Michx.) W. P. C. Barton, *C. ovalis* (Wangenh.) Sarg., *C. texana* Buckley (Дмитриева, 1961; Гоголишвили, Лория, 1989; Карпун, 2003).