

**ЦК; 33:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЮЗ:** Занг.  
Указан для **ЗК** (Галушко, 1980: 219).  
Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 12. **Coridium** Spach

30 (948). **H. asperuloides** Czern. ex Turcz. 1858, Bull. Soc. Nat. Moscou, 31, 2: 385. — *H. galiifolium* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 245 (Fl. Саус.).

Описан из Дагестана. Т у р u s: «In Dagestano boreali, prope Aut Schali, Patritzku» (KW).

**ЦК:** В. Тер.; **ВК:**

Указан для **ЦК:** Малк. (Галушко, 1980: 220).

Эндемик.

Sect. 13. **Adenosepalum** Spach

31 (949). **H. montanum** L. 1755, Fl. Suec. ed. 2: 266.

Описан из Швеции. Л е с т о т у р u s (Robson, 1996: 196): Herb. Linn. 943.39, «In montibus Westrogothiae 213. Skaniae» (LINN).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **33; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Европа; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев. Африка (Марокко).

Sect. 14. **Trigynobrathys** (Y. Kimura) N. Robson

32 (950). **H. mutilum** L. 1753, Sp. Pl.: 787.

Описан из Северной Америки. Л е с т о т у р u s (Fernald, 1939: 549): Virginia, Clayton 232 (BM (BM000042223)).

**33:** Абх., Адж. Заносное.

Сев. Америка.

Fam. 56. **ELATINACEAE** Dumort., nom. cons.\*

1 (166). **Bergia** L.

1 (951). **B. capensis** L. 1771, Mantissa Alt.: 241. — *B. aquatica* Roxb. 1800, Pl. Coromandel, 2: 22, tab. 142.

Описан из Южной Африки.

**Т.**

Южн. Европа (Пиренейский п-ов — заносное); Юго-Зап., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Сев., Центр., Южн. Африка; Сев., Центр., Южн. Америка; Австралия.

---

\* Н. Н. Цвелёв.

## 2 (167). *Elatine* L.

### Sect. 1. *Potamopithys* (Adans.) Seub.

1 (952). *E. alsinastrum* L. 1753, Sp. Pl.: 368.

Описан из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб. (по Кубани); **ВП:** В. Ставр. (по Куме); **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан.; **Т:**

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (зап.), Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия; Сев. Африка.

### Sect. 2. *Elatine*

2 (953). *E. orthosperma* Düben, 1839, Bot. Not. (Lund), 1: 88. — *E. hydropiper* L. subsp. *orthosperma* (Düben) F. Herm. 1912, Fl. Deutschl. Fennoskand.: 315. — *E. hydropiper* auct. non L.: Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 413; Шхиян, 1962, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 6: 179.

Описан из Швеции.

**ЗЗ:** Адж. (заносное в Батумском ботаническом саду).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Вост. Азия.

3 (954). *E. triandra* Schkuhr, 1794, Bot. Handb. 1: 345.

Описан из Центральной Европы.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (заносное на рисовых полях в низовьях Кубани) (Косенко, 1970: 236).

Европа; Ср., Вост. Азия; Сев., Южн. Америка.

## Superordo *Nepenthae*

### ORDO 21. *NEPENTHALES*

#### Fam. 57. *DROSERACEAE* Salisb., nom. cons.\*

### 1 (168). *Drosera* L.

1 (955). *D. rotundifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 282.

Описан по материалам из Европы, Азии и Америки.

**ЗК:** Уруп-Теб. (верховья Урупа); **БК:** Ассо-Арг; **ЗЗ:** Адж.

Европа; Сев., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

2 (956). *D. anglica* Huds. 1778, Fl. Angl. ed. 2, 1: 135.

Описан из Англии.

**ЗЗ:** Адж.

Европа; Сев., ?Юго-Зап. (Турция), Вост. Азия; Сев. Америка.

3 (957). *D. intermedia* Hayne, 1798, in Dreves, Bot. Bilderbuch, 3: 18, tab. 3, fig. B.

\* Н. Н. Цвелёв.