

2 (167). *Elatine* L.

Sect. 1. *Potamopithys* (Adans.) Seub.

1 (952). *E. alsinastrum* L. 1753, Sp. Pl.: 368.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб. (по Кубани); **ВП:** В. Ставр. (по Куме); **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан.; **Т:**

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (зап.), Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия; Сев. Африка.

Sect. 2. *Elatine*

2 (953). *E. orthosperma* Düben, 1839, Bot. Not. (Lund), 1: 88. — *E. hydropiper* L. subsp. *orthosperma* (Düben) F. Herm. 1912, Fl. Deutschl. Fennoskand.: 315. — *E. hydropiper* auct. non L.: Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 413; Шхиян, 1962, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 6: 179.

Описан из Швеции.

ЗЗ: Адж. (заносное в Батумском ботаническом саду).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Вост. Азия.

3 (954). *E. triandra* Schkuhr, 1794, Bot. Handb. 1: 345.

Описан из Центральной Европы.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (заносное на рисовых полях в низовьях Кубани) (Косенко, 1970: 236).

Европа; Ср., Вост. Азия; Сев., Южн. Америка.

Superordo *Nepenthae*

ORDO 21. *NEPENTHALES*

Fam. 57. *DROSERACEAE* Salisb., nom. cons.*

1 (168). *Drosera* L.

1 (955). *D. rotundifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 282.

Описан по материалам из Европы, Азии и Америки.

ЗК: Уруп-Теб. (верховья Урупа); **БК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Адж.

Европа; Сев., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

2 (956). *D. anglica* Huds. 1778, Fl. Angl. ed. 2, 1: 135.

Описан из Англии.

ЗЗ: Адж.

Европа; Сев., ?Юго-Зап. (Турция), Вост. Азия; Сев. Америка.

3 (957). *D. intermedia* Hayne, 1798, in Dreves, Bot. Bilderbuch, 3: 18, tab. 3, fig. B.

* Н. Н. Цвелёв.

Описан из Европы.

Указан для **ЗЗ**: Адж. (Дмитриева, 1990, 2: 86).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Сев. Америка.

Мы не видели экземпляров этого вида с Кавказа. Возможно, что за *D. intermedia* принимались мелкие экземпляры *D. anglica* или *D. × obovata* Mert. et W. D. J. Koch (*D. rotundifolia* × *D. anglica*).

2 (169). *Aldrovanda* L.

1 (958). *A. vesiculosa* L. 1753, Sp. Pl.: 281.

Описан из Италии и Индии.

ЗП: Аз.-Куб. (по Кубани); **ЗЗ**: Абх. (мыс Пицунда).

Европа; Средиз.; Ср., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Африка; Австралия.

Superordo Ericanae

ORDO 22. ERICALES

Fam. 58. **ERICACEAE** Juss., nom. cons.*

Subfam. 1. MONOTROPOIDEAE Arn.

Trib. **Hemitomeae** Domin

1 (170). *Hypopitys* Hill

1 (959). *H. monotropa* Crantz, 1766, Inst. Rei Herb. 2: 467; Бобр. 1952, Фл. СССР, 18: 21. — *Monotropa hypopithys* L. 1753, Sp. Pl.: 387. — *M. hypophegea* Wallr. 1822, Sched. Crit. 1: 191.

Описан из Западной Европы и Северной Америки.

ЗК: Адаг.-Пшиш. (верховья р. Пшиш), Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **Т**.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 79; Иванов, 2001: 102); **ЗК**: В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЦК**: В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 110); **ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1980, 2: 279); **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 431); **ЦЗ**: Лори (Гамбарян, 1973: 85).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Subfam. 2. PYROLOIDEAE Beilschm.

2 (171). *Pyrola* L.

1 (960). *P. rotundifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 396; Н. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 10.

Описан из Северной Европы и Северной Америки.

* Т. Н. Попова, С. В. Бондаренко.