

Описан из Европы.

Указан для **ЗЗ**: Адж. (Дмитриева, 1990, 2: 86).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Сев. Америка.

Мы не видели экземпляров этого вида с Кавказа. Возможно, что за *D. intermedia* принимались мелкие экземпляры *D. anglica* или *D. × obovata* Mert. et W. D. J. Koch (*D. rotundifolia* × *D. anglica*).

2 (169). *Aldrovanda* L.

1 (958). *A. vesiculosa* L. 1753, Sp. Pl.: 281.

Описан из Италии и Индии.

ЗП: Аз.-Куб. (по Кубани); **ЗЗ**: Абх. (мыс Пицунда).

Европа; Средиз.; Ср., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Африка; Австралия.

Superordo Ericanae

ORDO 22. ERICALES

Fam. 58. **ERICACEAE** Juss., nom. cons.*

Subfam. 1. MONOTROPOIDEAE Arn.

Trib. **Hemitomeae** Domin

1 (170). *Hypopitys* Hill

1 (959). *H. monotropa* Crantz, 1766, Inst. Rei Herb. 2: 467; Бобр. 1952, Фл. СССР, 18: 21. — *Monotropa hypopithys* L. 1753, Sp. Pl.: 387. — *M. hypophegea* Wallr. 1822, Sched. Crit. 1: 191.

Описан из Западной Европы и Северной Америки.

ЗК: Адаг.-Пшиш. (верховья р. Пшиш), Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **Т**.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 79; Иванов, 2001: 102); **ЗК**: В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЦК**: В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 110); **ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1980, 2: 279); **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 431); **ЦЗ**: Лори (Гамбарян, 1973: 85).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Subfam. 2. PYROLOIDEAE Beilschm.

2 (171). *Pyrola* L.

1 (960). *P. rotundifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 396; Н. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 10.

Описан из Северной Европы и Северной Америки.

* Т. Н. Попова, С. В. Бондаренко.

ЗП: З. Ставр. (окр. Ставрополя, р. Ташлы); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для всех лесных горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 278); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Агаджанов, 1957: 2).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

2 (1961). **P. media** Sw. 1804, Kongl. Vetensk. Akad. Nya Handl. 25: 257.

Описан из Швеции (окр. Стокгольма).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа, кроме **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980, 2: 278); для **ЗП:** З. Ставр.; **ЗК:** В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЦК:** В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 119); **ЦЗ:** Лори (Гамбарян, 1973: 85).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (Сибирь), Юго-Зап. (Турция) Азия.

На территории Армении представители рода *Pyrola* (*P. media* и *P. minor*) впервые были обнаружены в 1972 г. в Степанаванском районе — в буково-грабовом лесу в окрестностях дендропарка «Сосняки» (Гамбарян, 1973: 85).

3 (1962). **P. chlorantha** Sw. 1810, Kongl. Vetensk. Akad. Nya Handl. 31: 190. — *P. virens* Schweigg. 1811, in Schweigg. et Körte, Fl. Erlang. Add.: 154; Н. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 9 («*P. virescens*»).

Описан из Швеции.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЦК:** В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 119; Галушко, 1980, 2: 278); **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980, 2: 278).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция) Азия; Сев. Америка.

4 (1963). **P. minor** L. 1753, Sp. Pl.: 396.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа, кроме **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980, 2: 278); для **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЦЗ:** Лори (Гамбарян, 1973: 85).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср. (Тянь-Шань) Азия.

3 (172). **Moneses** Salisb. ex Gray

1 (1964). **M. uniflora** (L.) A. Gray, 1848, Manual: 273. — *Pyrola uniflora* L. 1753, Sp. Pl.: 397.

Описан из Северной Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗК:** В. Куб. (Галушко, 1980, 2: 278; Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур. (Галушко, 1980, 2: 278).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Сев. Анатолия), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

4 (173). *Orthilia* Raf.

1 (965). **O. secunda** (L.) House, 1921, Amer. Midl. Nat. 7: 134. — *Pyrola secunda* L. 1753, Sp. Pl.: 396. — *Ramischia secunda* (L.) Garcke, 1858, Fl. N. Mitt.-Deutschland, ed. 4: 222; Н. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 16.

Описан из Северной Европы.

ЗП: 3. Ставр. (окр. Ставрополя, р. Ташлы, Рыбное оз.); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **Т:**

Указан для всех горных лесных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 278); **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1967: 142, sub nom. *Pyrola secunda*; Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1990, 2: 80, sub nom. *Ramischia secunda*); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Агаджанов, 1957: 3, sub nom. *Ramischia secunda*).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Сев. Анатолия), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Subfam. 3. ARBUTOIDEAE Nied.

5 (174). *Arbutus* L.

1 (966). **A. andrachne** L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1024. — *A. andrachne* var. *serratifolia* (Kuntze) Kusn. 1904, Mat. фл. Кавк. 4, 1: 37; Дмитриева, 1990, Определ. раст. Адж. изд. 2, 2: 81.

Описан из Средиземноморья.

ЗЗ: Абх. (Пицунда), Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (окр. Тбилиси); **ВЗ:** Караб.

Указан для **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 432).

Юго-Вост. Европа (юг Крыма); Средиз. (вост.); Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, Сирия, Ливан, сев. Ирак).

6 (175). *Arctostaphylos* Adans., nom. cons.

1 (967). **A. caucasica** Lipsch. 1961, Бот. мат. (Ленинград), 21: 290; Гагнидзе, 1985, Фл. Груз. изд. 2, 10: 37, cum auct. (Kvaratzchelia) Lipsch. — *A. uva-ursi* (L.) Spreng. subsp. *caucasica* Kvaratzchelia, 1948, в Колак. Фл. Абх. 3: 262, nom. nud. — *A. uva-ursi* auct. fl. cauc. non (L.) Spreng. 1825: Кузн. 1904, Mat. фл. Кавк. 4, 1: 39; Е. А. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 83; Габриэлян, 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 148; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 432.

Описан из Абхазии. *Typus*: «Abchazia, prope lacum Riza, in pinetis calcareis, 22 V 1959, № 47, S. Lipschitz» (LE!).

ЗК; ЦК: В. Кум. (Бермамыт); **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир. Указан для **ЦК:** Малк., В. Тер. (Галушко, 1980, 2: 280).

Эндемик.

Отличается от евроазиатского *A. uva-ursi* крупными широкими листьями и менее густой облиственностью годовалых побегов (Липшиц, 1961).

Subfam. 4. EPIGAEOIDEAE Takht.

7 (176). *Epigaea* L.

1 (968). **E. gaultherioides** (Boiss. et Bal.) Takht. 1941, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 10: 32. — *Rhododendron gaultherioides* Boiss. et Bal. 1866, in Bal. Pl. Pont. Exs.: № 359. — *Orphanidesia gaultherioides* (Boiss. et Bal.) Boiss. et Bal. 1875, in Boiss. Fl. Or. 3: 968; Кузн. 1904, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 490.

Описан из северной Турции. *Typus* (fide Stevens, 1978: 94): «In collibus sub-alpinis Ponti Lazici inter Andon (Anton) et Djimil (Cimil), 2290 m, Balansa» (G).

ЗЗ: Адж.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Subfam. 5. ERICOIDEAE Arn.

Trib. *Ericaceae* DC. ex Duby

8 (177). *Erica* L.

1 (969). **E. arborea** L. 1753, Sp. Pl.: 353.

Описан из Южной Европы.

ЗЗ: Абх. (окр. Пицунды, восточнее рыбозавода).

Юго-Вост. Европа (юг); Средиз.; Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Subfam. 6. RHODODENDROIDEAE Sweet

Trib. *Rhododendreae* Colla

9 (178). *Rhododendron* L.

Subgen. *Pentathera* (G. Don) Pojark.

1 (970). **R. luteum** Sweet, 1830, Hort. Brit. ed. 2: 343. — *R. flavum* G. Don, 1834, Gen. Hist. 3: 847; Кузн. 1901, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 31; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 526. — *Azalea pontica* L. 1753, Sp. Pl.: 150; Bieb. 1808, Fl. Taur.-Саус. 1: 144; id. 1819, l. c. 3: 136. — *A. pontica* var. *autumnalis* C. Koch, 1843, Linnaea, 17: 281.

Описан из Турции («In Ponto, Trapezunte»).

ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ; ЮЗ.**

Указан для всех лесных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 280).

Центр., Юго-Вост. (Балканский п-ов), Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (971). **R. smirnowii** Trautv. 1885, in Regel, Gartenflora, 34: 331. — *R. lazicum* Massalski, 1886, Нов. обозр.: 846.

Описан из Турции (Артвин, к югу от Батума). *Typus*: «Prope Artwin districtus Batum promiscue cum *R. ponticum* L. et *R. ungeronii* Trautv. ex observationibus M. N. Smirnowii crescit» (LE!).

ЗЗ: Адж. (Кедский р-н).

Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Вид растет в Аджарии у с. Намонастреви, в верховьях р. Мериси, в ущельях рек Гвирабисцхали, Омасцхали и Сатевзио — притоков Мериси. Встречается в родоретах совместно с *R. ponticum* L. и *R. ungeronii* Trautv. на северных склонах тенистых ущелий (Дмитриева, Манджавидзе, 1963).

3 (972). **R. ungeronii** Trautv. 1885, in Regel, Gartenflora, 34: 335.

Описан из Турции. *Typus*: «Prope Artwin, districtus Batum (1220–1230 m), Ungern Steinberg» (LE!).

ЗЗ: Адж.

Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Ареал *R. ungeronii* гораздо шире, чем у *R. smirnowii*. В Аджарии этот вид встречается в верховьях рек Бзубзо, Дбети, Джунджа, Кинтриш, Коронистави, Мачахели, Мериси, Чаква, на горах Гома, Медзыбна, в окрестностях Батума (массив Мтирала) (Александрова, 1973), в ущелье Аджарисцкали и некоторых других пунктах.

4 (973). **R. ponticum** L. 1762, Sp. Pl. ed. 2, 3: 562.

Описан из Турции. *Lectotypus* (Stevens, 1978: 93): Herb. Linn. 562/5 (LINN).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ**: Месх.

Указан для **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (верховья р. Пшиш) (Галушко, 1980, 2: 280).

Атл. (Португалия), Юго-Вост. (юг) Европа; Средиз. (южн. Испания); Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан).

5 (974). **R. caucasicum** Pall. 1784, Fl. Ross. 1, 1: 46. — *Azalea caucasica* (Pall.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 387.

Описан с Кавказа («Caucasica»). *Synonymi*: «In summis Caucasi alpinis, a latere septentrionali Caucasi in Ossetia inter Tschim et Tschinaga, et in Caucaso australiore, Gùldenstadt» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Н. Кур.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.

Юго-Зап. Азия (сев. Турция, сев. Иран).

6 (975). **R. × sochadzeae** Charadze et Davlian. 1967, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 27: 84; P. F. Stevens, 1978, Fl. Turk. 6: 93; Давлиан. 1985, Фл. Груз. изд. 2, 10: 33. = *R. ponticum* × *R. caucasicum*.

Описан из западной Грузии. *Typus*: «Georgia, Megrelia jugi Okhaczkuie, in declivio orientali, Aciculisilvae in Rhodoreto caucaso in solo calcareo locus “Patara Djakona”, 11 VII 1964, E. et M. Sochadze et Davlianidze» (TBI).

ЗЗ: Абх. (хр. Охачкуэ и Квира), Инг.-Рион.
Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Зернов, 2006: 432); **ЗЗ:** Адж. (горы Сакулаперди и Чирухи (Хохряков и др., 2005: 60).
Юго-Зап. Азия (Турция: Артвин, г. Мургул).

Subfam. 7. VACCINIOIDEAE Arn.

Trib. **Vaccinieae** Rchb.

10 (179). **Vaccinium** L.

Sect. 1. **Vitis-idaea** W. D. J. Koch

1 (976). **V. vitis-idaea** L. 1753, Sp. Pl.: 351. — *Rhodococcum vitis-idaea* (L.) Avrorin, 1958, Кат. сем. Полярн. альп. бот. сада, 13: 51, nom. illeg., sine bas.; Галушко, 1980, Фл. Сев. Кавк. 2: 281, cum auct. (Rupr.) Avrorin.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (верховья р. Пшиш) (Галушко, 1980, 2: 281, sub nom. *Rhodococcum vitis-idaea*).

Европа; Средиз. (Балканский п-ов); Сев., Юго-Зап., Центр. (сев. Монголия), Вост. (Корея, Манчжурия) Азия; Сев. Америка.

Sect. 2. **Vaccinium**

2 (977). **V. myrtilus** L. 1753, Sp. Pl.: 349.

Описан из Северной Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для **ЮЗЗ:** Месх. (Гагнидзе, 1985: 41).

Европа; Средиз.; Сев. (Сибирь), Юго-Зап., Центр. (сев. Монголия) Азия; Сев. Америка.

3 (978). **V. uliginosum** L. 1753, Sp. Pl.: 350. — *V. uliginosum* subsp. *khokhrjakovii* Mazurenko, 1989, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 94, 6: 97.

Описан с севера Швеции.

ЗЗ: Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗ:** Севан. (Гегамский хр.).

Европа (от Арктики до гор Южн. Европы); Сев. Азия (умеренные районы до Монголии и Кореи); Сев. Америка (Аляска, Гренландия).

Редкий вид в высокогорьях Закавказья. Р. F. Stevens (1978) предположил, что в горах юга Европы и Турции встречается *V. uliginosum* subsp. *microphyllum* Lange (2n = 24), распространенный в арктических и субарктических районах Европы (Порова, 1972). Растения из Понтийских гор Турции и Аджарии действительно очень похожи на subsp. *microphyllum* — это такие же низкорослые кустики с мелкими листьями (1.1–1.8 мм дл.), но они отличаются от арктических более длинными цветоножками (до 5 мм дл.), сильно отогнутыми долями околоцветника, от-

сутствием опушения листьев и черешков. М. Т. Мазуренко (1989) выделила их в ранге подвида — *V. uliginosum* subsp. *khokhrjakovii*, однако до изучения мелколистных форм в разных частях ареала голубики в Европе ($2n = 48$) выделение подвидов преждевременно.

4 (979). **V. arctostaphylos** L. 1753, Sp. Pl.: 351.

Описан из северной Турции. *Lectotypus* (Stevens, 1978: 102): Herb. Linn. 497.14, «Turcika, cappadocica, Tournefort» (LINN).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ЗЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Месх.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (верховья р. Пшиш); **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980, 2: 281).

Юго-Вост. Европа (горы Странджа); Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Fam. 59. **EMPETRACEAE** Hook. et Lindl., nom. cons.*

(*Ericaceae* Juss. subfam. *Empetroideae* Sweet: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 192)

1 (180). **Empetrum** L.

1 (980). **E. caucasicum** Juz. 1955, Список раст. Герб. фл. СССР, 13, 79: 79 (in adnot. № 3923. *E. hermaphroditum* (Lange) Hagerup); В. Н. Васил. 1961, Род *Empetrum*: 62, табл. 13; Фёд. 1962, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 6: 100, cum auct. (V. N. Vassil.) Juz. — *E. androgynum* V. N. Vassil. 1947, Реф. науч.-исслед. работ за 1945 г.: Отд. биол. наук АН СССР: 3, р. р. — *E. androgynum* var. *caucasicum* V. N. Vassil. 1949, Фл. СССР, 14: 516, in adnot., nom. nud. — *E. nigrum* L. subsp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher, 1952, Meddel. Grønland, 147, 9: 81, р. р.; R. R. Mill, 1982, Fl. Turk. 7: 632, р. р. — *E. nigrum* subsp. *caucasicum* (Juz.) Kuvaeв, 1996, Бот. журн. 81, 10: 113. — *E. nigrum* auct. fl. cauc. non L.: Е. А. Буш, 1911, Мат. Крым.-Кавк. фл. 3, 8: 10. — *E. hermaphroditum* auct. fl. cauc. non Hagerup: Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 527.

Описан с Западного Кавказа (верховья истоков Кубани). *Turpus*: «Kuban prov. Верховья западного истока Черю-кола [«Черко-кола» — ошибка], альп. пояс, 4 VIII 1907, № 766, пл., N. A. Busch, Iter caucasicum VIII» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Туап.-Адл. (Фишт); **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Н. Н. Цвелёв (1980) считает, что *E. caucasicum* происходит от гибридизации *E. hermaphroditum* с *E. subholarcticum* V. N. Vassil. На Кавказе встречаются популяции, приближающиеся по форме листьев то к одному, то к другому из предполагаемых родительских видов, которые оба имеют обоеполые цветки.

* Т. Н. Попова, Н. Н. Цвелёв.