

Описан из Европы.

Указан для **ЗЗ**: Адж. (Дмитриева, 1990, 2: 86).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Сев. Америка.

Мы не видели экземпляров этого вида с Кавказа. Возможно, что за *D. intermedia* принимались мелкие экземпляры *D. anglica* или *D. × obovata* Mert. et W. D. J. Koch (*D. rotundifolia* × *D. anglica*).

## 2 (169). *Aldrovanda* L.

1 (958). *A. vesiculosa* L. 1753, Sp. Pl.: 281.

Описан из Италии и Индии.

**ЗП**: Аз.-Куб. (по Кубани); **ЗЗ**: Абх. (мыс Пицунда).

Европа; Средиз.; Ср., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Африка; Австралия.

## Superordo Ericanae

### ORDO 22. ERICALES

Fam. 58. **ERICACEAE** Juss., nom. cons.\*

Subfam. 1. **MONOTROPOIDEAE** Arn.

Trib. **Hemitomeae** Domin

#### 1 (170). *Hypopitys* Hill

1 (959). *H. monotropa* Crantz, 1766, Inst. Rei Herb. 2: 467; Бобр. 1952, Фл. СССР, 18: 21. — *Monotropa hypopithys* L. 1753, Sp. Pl.: 387. — *M. hypophegea* Wallr. 1822, Sched. Crit. 1: 191.

Описан из Западной Европы и Северной Америки.

**ЗК**: Адаг.-Пшиш. (верховья р. Пшиш), Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **Т**.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 79; Иванов, 2001: 102); **ЗК**: В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЦК**: В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 110); **ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1980, 2: 279); **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 431); **ЦЗ**: Лори (Гамбарян, 1973: 85).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Subfam. 2. **PYROLOIDEAE** Beilschm.

#### 2 (171). *Pyrola* L.

1 (960). *P. rotundifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 396; Н. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 10.

Описан из Северной Европы и Северной Америки.

\* Т. Н. Попова, С. В. Бондаренко.