

Описан из Европы.

Указан для **ЗЗ**: Адж. (Дмитриева, 1990, 2: 86).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Сев. Америка.

Мы не видели экземпляров этого вида с Кавказа. Возможно, что за *D. intermedia* принимались мелкие экземпляры *D. anglica* или *D. × obovata* Mert. et W. D. J. Koch (*D. rotundifolia* × *D. anglica*).

2 (169). *Aldrovanda* L.

1 (958). *A. vesiculosa* L. 1753, Sp. Pl.: 281.

Описан из Италии и Индии.

ЗП: Аз.-Куб. (по Кубани); **ЗЗ**: Абх. (мыс Пицунда).

Европа; Средиз.; Ср., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Африка; Австралия.

Superordo Ericanae

ORDO 22. ERICALES

Fam. 58. **ERICACEAE** Juss., nom. cons.*

Subfam. 1. MONOTROPOIDEAE Arn.

Trib. **Hemitomeae** Domin

1 (170). *Hypopitys* Hill

1 (959). *H. monotropa* Crantz, 1766, Inst. Rei Herb. 2: 467; Бобр. 1952, Фл. СССР, 18: 21. — *Monotropa hypopithys* L. 1753, Sp. Pl.: 387. — *M. hypophegea* Wallr. 1822, Sched. Crit. 1: 191.

Описан из Западной Европы и Северной Америки.

ЗК: Адаг.-Пшиш. (верховья р. Пшиш), Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **Т**.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 79; Иванов, 2001: 102); **ЗК**: В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЦК**: В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 110); **ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1980, 2: 279); **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 431); **ЦЗ**: Лори (Гамбарян, 1973: 85).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Subfam. 2. PYROLOIDEAE Beilschm.

2 (171). *Pyrola* L.

1 (960). *P. rotundifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 396; Н. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 10.

Описан из Северной Европы и Северной Америки.

* Т. Н. Попова, С. В. Бондаренко.

ЗП: З. Ставр. (окр. Ставрополя, р. Ташлы); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для всех лесных горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 278); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Агаджанов, 1957: 2).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

2 (1961). **P. media** Sw. 1804, Kongl. Vetensk. Akad. Nya Handl. 25: 257.

Описан из Швеции (окр. Стокгольма).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа, кроме **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980, 2: 278); для **ЗП:** З. Ставр.; **ЗК:** В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЦК:** В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 119); **ЦЗ:** Лори (Гамбарян, 1973: 85).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (Сибирь), Юго-Зап. (Турция) Азия.

На территории Армении представители рода *Pyrola* (*P. media* и *P. minor*) впервые были обнаружены в 1972 г. в Степанаванском районе — в буково-грабовом лесу в окрестностях дендропарка «Сосняки» (Гамбарян, 1973: 85).

3 (1962). **P. chlorantha** Sw. 1810, Kongl. Vetensk. Akad. Nya Handl. 31: 190. — *P. virens* Schweigg. 1811, in Schweigg. et Körte, Fl. Erlang. Add.: 154; Н. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 9 («*P. virescens*»).

Описан из Швеции.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЦК:** В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 119; Галушко, 1980, 2: 278); **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980, 2: 278).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция) Азия; Сев. Америка.

4 (1963). **P. minor** L. 1753, Sp. Pl.: 396.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа, кроме **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980, 2: 278); для **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЦЗ:** Лори (Гамбарян, 1973: 85).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср. (Тянь-Шань) Азия.

3 (172). **Moneses** Salisb. ex Gray

1 (1964). **M. uniflora** (L.) A. Gray, 1848, Manual: 273. — *Pyrola uniflora* L. 1753, Sp. Pl.: 397.