

ЗП: З. Ставр. (окр. Ставрополя, р. Ташлы); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для всех лесных горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 278); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Агаджанов, 1957: 2).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

2 (1961). **P. media** Sw. 1804, Kongl. Vetensk. Akad. Nya Handl. 25: 257.

Описан из Швеции (окр. Стокгольма).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа, кроме **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980, 2: 278); для **ЗП:** З. Ставр.; **ЗК:** В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЦК:** В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 119); **ЦЗ:** Лори (Гамбарян, 1973: 85).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (Сибирь), Юго-Зап. (Турция) Азия.

На территории Армении представители рода *Pyrola* (*P. media* и *P. minor*) впервые были обнаружены в 1972 г. в Степанаванском районе — в буково-грабовом лесу в окрестностях дендропарка «Сосняки» (Гамбарян, 1973: 85).

3 (1962). **P. chlorantha** Sw. 1810, Kongl. Vetensk. Akad. Nya Handl. 31: 190. — *P. virens* Schweigg. 1811, in Schweigg. et Körte, Fl. Erlang. Add.: 154; Н. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 9 («*P. virescens*»).

Описан из Швеции.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЦК:** В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 119; Галушко, 1980, 2: 278); **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980, 2: 278).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция) Азия; Сев. Америка.

4 (1963). **P. minor** L. 1753, Sp. Pl.: 396.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа, кроме **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980, 2: 278); для **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЦЗ:** Лори (Гамбарян, 1973: 85).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср. (Тянь-Шань) Азия.

3 (172). **Moneses** Salisb. ex Gray

1 (1964). **M. uniflora** (L.) A. Gray, 1848, Manual: 273. — *Pyrola uniflora* L. 1753, Sp. Pl.: 397.

Описан из Северной Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Абх., Инг-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗК:** В. Куб. (Галушко, 1980, 2: 278; Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур. (Галушко, 1980, 2: 278).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Сев. Анатолия), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

4 (173). *Orthilia* Raf.

1 (965). **O. secunda** (L.) House, 1921, Amer. Midl. Nat. 7: 134. — *Pyrola secunda* L. 1753, Sp. Pl.: 396. — *Ramischia secunda* (L.) Garcke, 1858, Fl. N. Mitt.-Deutschland, ed. 4: 222; Н. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 16.

Описан из Северной Европы.

ЗП: 3. Ставр. (окр. Ставрополя, р. Ташлы, Рыбное оз.); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **Т:**

Указан для всех горных лесных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 278); **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1967: 142, sub nom. *Pyrola secunda*; Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1990, 2: 80, sub nom. *Ramischia secunda*); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Агаджанов, 1957: 3, sub nom. *Ramischia secunda*).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Сев. Анатолия), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Subfam. 3. ARBUTOIDEAE Nied.

5 (174). *Arbutus* L.

1 (966). **A. andrachne** L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1024. — *A. andrachne* var. *serratifolia* (Kuntze) Kusn. 1904, Mat. фл. Кавк. 4, 1: 37; Дмитриева, 1990, Определ. раст. Адж. изд. 2, 2: 81.

Описан из Средиземноморья.

ЗЗ: Абх. (Пицунда), Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (окр. Тбилиси); **ВЗ:** Караб.

Указан для **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 432).

Юго-Вост. Европа (юг Крыма); Средиз. (вост.); Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, Сирия, Ливан, сев. Ирак).

6 (175). *Arctostaphylos* Adans., nom. cons.

1 (967). **A. caucasica** Lipsch. 1961, Бот. мат. (Ленинград), 21: 290; Гагнидзе, 1985, Фл. Груз. изд. 2, 10: 37, cum auct. (Kvaratzchelia) Lipsch. — *A. uva-ursi* (L.) Spreng. subsp. *caucasica* Kvaratzchelia, 1948, в Колак. Фл. Абх. 3: 262, nom. nud. — *A. uva-ursi* auct. fl. cauc. non (L.) Spreng. 1825: Кузн. 1904, Mat. фл. Кавк. 4, 1: 39; Е. А. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 83; Габриэлян, 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 148; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 432.