

Описан из Северной Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Абх., Инг-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗК:** В. Куб. (Галушко, 1980, 2: 278; Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур. (Галушко, 1980, 2: 278).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Сев. Анатолия), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

4 (173). *Orthilia* Raf.

1 (965). **O. secunda** (L.) House, 1921, Amer. Midl. Nat. 7: 134. — *Pyrola secunda* L. 1753, Sp. Pl.: 396. — *Ramischia secunda* (L.) Garcke, 1858, Fl. N. Mitt.-Deutschland, ed. 4: 222; Н. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 16.

Описан из Северной Европы.

ЗП: 3. Ставр. (окр. Ставрополя, р. Ташлы, Рыбное оз.); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **Т:**

Указан для всех горных лесных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 278); **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1967: 142, sub nom. *Pyrola secunda*; Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1990, 2: 80, sub nom. *Ramischia secunda*); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Агаджанов, 1957: 3, sub nom. *Ramischia secunda*).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Сев. Анатолия), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Subfam. 3. ARBUTOIDEAE Nied.

5 (174). *Arbutus* L.

1 (966). **A. andrachne** L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1024. — *A. andrachne* var. *serratifolia* (Kuntze) Kusn. 1904, Mat. фл. Кавк. 4, 1: 37; Дмитриева, 1990, Определ. раст. Адж. изд. 2, 2: 81.

Описан из Средиземноморья.

ЗЗ: Абх. (Пицунда), Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (окр. Тбилиси); **ВЗ:** Караб.

Указан для **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 432).

Юго-Вост. Европа (юг Крыма); Средиз. (вост.); Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, Сирия, Ливан, сев. Ирак).

6 (175). *Arctostaphylos* Adans., nom. cons.

1 (967). **A. caucasica** Lipsch. 1961, Бот. мат. (Ленинград), 21: 290; Гагнидзе, 1985, Фл. Груз. изд. 2, 10: 37, cum auct. (Kvaratzchelia) Lipsch. — *A. uva-ursi* (L.) Spreng. subsp. *caucasica* Kvaratzchelia, 1948, в Колак. Фл. Абх. 3: 262, nom. nud. — *A. uva-ursi* auct. fl. cauc. non (L.) Spreng. 1825: Кузн. 1904, Mat. фл. Кавк. 4, 1: 39; Е. А. Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 83; Габриэлян, 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 148; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 432.

Описан из Абхазии. Т у р u s: «Abchazia, prope lacum Riza, in pinetis calcareis, 22 V 1959, № 47, S. Lipschitz» (LE!).

ЗК; ЦК: В. Кум. (Бермамыт); **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.
Указан для **ЦК:** Малк., В. Тер. (Галушко, 1980, 2: 280).

Эндемик.

Отличается от евроазиатского *A. uva-ursi* крупными широкими листьями и менее густой облиственностью годовалых побегов (Липшиц, 1961).

Subfam. 4. EPIGAEOIDEAE Takht.

7 (176). **Epigaea** L.

1 (968). **E. gaultherioides** (Boiss. et Bal.) Takht. 1941, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 10: 32. — *Rhododendron gaultherioides* Boiss. et Bal. 1866, in Bal. Pl. Pont. Exs.: № 359. — *Orphanidesia gaultherioides* (Boiss. et Bal.) Boiss. et Bal. 1875, in Boiss. Fl. Or. 3: 968; Кузн. 1904, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 490.

Описан из северной Турции. Т у р u s (fide Stevens, 1978: 94): «In collibus sub-alpinis Ponti Lazici inter Andon (Anton) et Djimil (Cimil), 2290 m, Balansa» (G).

ЗЗ: Адж.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Subfam. 5. ERICOIDEAE Arn.

Trib. **Ericaceae** DC. ex Duby

8 (177). **Erica** L.

1 (969). **E. arborea** L. 1753, Sp. Pl.: 353.

Описан из Южной Европы.

ЗЗ: Абх. (окр. Пицунды, восточнее рыбозавода).

Юго-Вост. Европа (юг); Средиз.; Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Subfam. 6. RHODODENDROIDEAE Sweet

Trib. **Rhododendreae** Colla

9 (178). **Rhododendron** L.

Subgen. **Pentathera** (G. Don) Pojark.

1 (970). **R. luteum** Sweet, 1830, Hort. Brit. ed. 2: 343. — *R. flavum* G. Don, 1834, Gen. Hist. 3: 847; Кузн. 1901, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 31; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 526. — *Azalea pontica* L. 1753, Sp. Pl.: 150; Bieb. 1808, Fl. Taur.-Саус. 1: 144; id. 1819, l. c. 3: 136. — *A. pontica* var. *autumnalis* C. Koch, 1843, Linnaea, 17: 281.

Описан из Турции («In Ponto, Trapezunte»).

ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ; ЮЗ.**

Указан для всех лесных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 280).

Центр., Юго-Вост. (Балканский п-ов), Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).