

Описан из Абхазии. Т у р u s: «Abchazia, prope lacum Riza, in pinetis calcareis, 22 V 1959, № 47, S. Lipschitz» (LE!).

ЗК; ЦК: В. Кум. (Бермамыт); **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир. Указан для **ЦК:** Малк., В. Тер. (Галушко, 1980, 2: 280).

Эндемик.

Отличается от евроазиатского *A. uva-ursi* крупными широкими листьями и менее густой облиственностью годовалых побегов (Липшиц, 1961).

Subfam. 4. EPIGAEOIDEAE Takht.

7 (176). **Epigaea** L.

1 (968). **E. gaultherioides** (Boiss. et Bal.) Takht. 1941, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 10: 32. — *Rhododendron gaultherioides* Boiss. et Bal. 1866, in Bal. Pl. Pont. Exs.: № 359. — *Orphanidesia gaultherioides* (Boiss. et Bal.) Boiss. et Bal. 1875, in Boiss. Fl. Or. 3: 968; Кузн. 1904, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 490.

Описан из северной Турции. Т у р u s (fide Stevens, 1978: 94): «In collibus sub-alpinis Ponti Lazici inter Andon (Anton) et Djimil (Cimil), 2290 m, Balansa» (G).

ЗЗ: Адж.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Subfam. 5. ERICOIDEAE Arn.

Trib. **Ericaceae** DC. ex Duby

8 (177). **Erica** L.

1 (969). **E. arborea** L. 1753, Sp. Pl.: 353.

Описан из Южной Европы.

ЗЗ: Абх. (окр. Пицунды, восточнее рыбозавода).

Юго-Вост. Европа (юг); Средиз.; Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Subfam. 6. RHODODENDROIDEAE Sweet

Trib. **Rhododendreae** Colla

9 (178). **Rhododendron** L.

Subgen. **Pentathera** (G. Don) Pojark.

1 (970). **R. luteum** Sweet, 1830, Hort. Brit. ed. 2: 343. — *R. flavum* G. Don, 1834, Gen. Hist. 3: 847; Кузн. 1901, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 31; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 526. — *Azalea pontica* L. 1753, Sp. Pl.: 150; Bieb. 1808, Fl. Taur.-Саус. 1: 144; id. 1819, l. c. 3: 136. — *A. pontica* var. *autumnalis* C. Koch, 1843, Linnaea, 17: 281.

Описан из Турции («In Ponto, Trapezunte»).

ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ; ЮЗ.**

Указан для всех лесных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 280).

Центр., Юго-Вост. (Балканский п-ов), Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).