

Описан из Абхазии. *Typus*: «Abchazia, prope lacum Riza, in pinetis calcareis, 22 V 1959, № 47, S. Lipschitz» (LE!).

**ЗК; ЦК:** В. Кум. (Бермамыт); **БК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.  
Указан для **ЦК:** Малк., В. Тер. (Галушко, 1980, 2: 280).

Эндемик.

Отличается от евроазиатского *A. uva-ursi* крупными широкими листьями и менее густой облиственностью годовалых побегов (Липшиц, 1961).

#### Subfam. 4. EPIGAEOIDEAE Takht.

##### 7 (176). *Epigaea* L.

1 (968). **E. gaultherioides** (Boiss. et Bal.) Takht. 1941, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 10: 32. — *Rhododendron gaultherioides* Boiss. et Bal. 1866, in Bal. Pl. Pont. Exs.: № 359. — *Orphanidesia gaultherioides* (Boiss. et Bal.) Boiss. et Bal. 1875, in Boiss. Fl. Or. 3: 968; Кузн. 1904, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 490.

Описан из северной Турции. *Typus* (fide Stevens, 1978: 94): «In collibus sub-alpinis Ponti Lazici inter Andon (Anton) et Djimil (Cimil), 2290 m, Balansa» (G).

**ЗЗ:** Адж.

Юго-Зап. Азия (Турция).

#### Subfam. 5. ERICOIDEAE Arn.

##### Trib. *Ericaceae* DC. ex Duby

##### 8 (177). *Erica* L.

1 (969). **E. arborea** L. 1753, Sp. Pl.: 353.

Описан из Южной Европы.

**ЗЗ:** Абх. (окр. Пицунды, восточнее рыбозавода).

Юго-Вост. Европа (юг); Средиз.; Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

#### Subfam. 6. RHODODENDROIDEAE Sweet

##### Trib. *Rhododendreae* Colla

##### 9 (178). *Rhododendron* L.

##### Subgen. *Pentathera* (G. Don) Pojark.

1 (970). **R. luteum** Sweet, 1830, Hort. Brit. ed. 2: 343. — *R. flavum* G. Don, 1834, Gen. Hist. 3: 847; Кузн. 1901, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 31; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 526. — *Azalea pontica* L. 1753, Sp. Pl.: 150; Bieb. 1808, Fl. Taur.-Саус. 1: 144; id. 1819, l. c. 3: 136. — *A. pontica* var. *autumnalis* C. Koch, 1843, Linnaea, 17: 281.

Описан из Турции («In Ponto, Trapezunte»).

**ЗК; ЦК; БК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ; ЮЗ.**

Указан для всех лесных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 280).

Центр., Юго-Вост. (Балканский п-ов), Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (971). **R. smirnowii** Trautv. 1885, in Regel, Gartenflora, 34: 331. — *R. lazicum* Massalski, 1886, Нов. обозр.: 846.

Описан из Турции (Артвин, к югу от Батума). *Typus*: «Prope Artwin districtus Batum promiscue cum *R. ponticum* L. et *R. ungeronii* Trautv. ex observationibus M. N. Smirnowii crescit» (LE!).

**ЗЗ**: Адж. (Кедский р-н).

Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Вид растет в Аджарии у с. Намонастреви, в верховьях р. Мериси, в ущельях рек Гвирабисцхали, Омасцхали и Сатевзио — притоков Мериси. Встречается в родоретах совместно с *R. ponticum* L. и *R. ungeronii* Trautv. на северных склонах тенистых ущелий (Дмитриева, Манджавидзе, 1963).

3 (972). **R. ungeronii** Trautv. 1885, in Regel, Gartenflora, 34: 335.

Описан из Турции. *Typus*: «Prope Artwin, districtus Batum (1220–1230 m), Ungern Steinberg» (LE!).

**ЗЗ**: Адж.

Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Ареал *R. ungeronii* гораздо шире, чем у *R. smirnowii*. В Аджарии этот вид встречается в верховьях рек Бзубзо, Дбети, Джунджа, Кинтриш, Коронистави, Мачахели, Мериси, Чаква, на горах Гома, Медзыбна, в окрестностях Батума (массив Мтирала) (Александрова, 1973), в ущелье Аджарисцкали и некоторых других пунктах.

4 (973). **R. ponticum** L. 1762, Sp. Pl. ed. 2, 3: 562.

Описан из Турции. *Lectotypus* (Stevens, 1978: 93): Herb. Linn. 562/5 (LINN).

**ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ**: Месх. Указан для **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (верховья р. Пшиш) (Галушко, 1980, 2: 280).

Атл. (Португалия), Юго-Вост. (юг) Европа; Средиз. (южн. Испания); Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан).

5 (974). **R. caucasicum** Pall. 1784, Fl. Ross. 1, 1: 46. — *Azalea caucasica* (Pall.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 387.

Описан с Кавказа («Caucasica»). *Synonymi*: «In summis Caucasi alpinis, a latere septentrionali Caucasi in Ossetia inter Tschim et Tschinaga, et in Caucaso australiore, Gùldenstadt» (LE!).

**ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: Аско-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Н. Кур.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.

Юго-Зап. Азия (сев. Турция, сев. Иран).

6 (975). **R. × sochadzeae** Charadze et Davlian. 1967, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 27: 84; P. F. Stevens, 1978, Fl. Turk. 6: 93; Давлиан. 1985, Фл. Груз. изд. 2, 10: 33. = *R. ponticum* × *R. caucasicum*.

Описан из западной Грузии. *Typus*: «Georgia, Megrelia jugi Okhaczkuie, in declivio orientali, Aciculisilvae in Rhodoreto caucaso in solo calcareo locus “Patara Djakona”, 11 VII 1964, E. et M. Sochadze et Davlianidze» (TBI).

**ЗЗ:** Абх. (хр. Охачкуэ и Квира), Инг.-Рион.  
Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Зернов, 2006: 432); **ЗЗ:** Адж. (горы Сакулаперди и Чирухи (Хохряков и др., 2005: 60).  
Юго-Зап. Азия (Турция: Артвин, г. Мургул).

Subfam. 7. VACCINIOIDEAE Arn.

Trib. **Vaccinieae** Rchb.

10 (179). **Vaccinium** L.

Sect. 1. **Vitis-idaea** W. D. J. Koch

1 (976). **V. vitis-idaea** L. 1753, Sp. Pl.: 351. — *Rhodococcum vitis-idaea* (L.) Avrorin, 1958, Кат. сем. Полярн. альп. бот. сада, 13: 51, nom. illeg., sine bas.; Галушко, 1980, Фл. Сев. Кавк. 2: 281, cum auct. (Rupr.) Avrorin.

Описан из Европы.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (верховья р. Пшиш) (Галушко, 1980, 2: 281, sub nom. *Rhodococcum vitis-idaea*).

Европа; Средиз. (Балканский п-ов); Сев., Юго-Зап., Центр. (сев. Монголия), Вост. (Корея, Манчжурия) Азия; Сев. Америка.

Sect. 2. **Vaccinium**

2 (977). **V. myrtilus** L. 1753, Sp. Pl.: 349.

Описан из Северной Европы.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для **ЮЗЗ:** Месх. (Гагнидзе, 1985: 41).

Европа; Средиз.; Сев. (Сибирь), Юго-Зап., Центр. (сев. Монголия) Азия; Сев. Америка.

3 (978). **V. uliginosum** L. 1753, Sp. Pl.: 350. — *V. uliginosum* subsp. *khokhrjakovii* Mazurenko, 1989, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 94, 6: 97.

Описан с севера Швеции.

**ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗ:** Севан. (Гегамский хр.).

Европа (от Арктики до гор Южн. Европы); Сев. Азия (умеренные районы до Монголии и Кореи); Сев. Америка (Аляска, Гренландия).

Редкий вид в высокогорьях Закавказья. Р. F. Stevens (1978) предположил, что в горах юга Европы и Турции встречается *V. uliginosum* subsp. *microphyllum* Lange (2n = 24), распространенный в арктических и субарктических районах Европы (Порова, 1972). Растения из Понтийских гор Турции и Аджарии действительно очень похожи на subsp. *microphyllum* — это такие же низкорослые кустики с мелкими листьями (1.1–1.8 мм дл.), но они отличаются от арктических более длинными цветоножками (до 5 мм дл.), сильно отогнутыми долями околоцветника, от-