

сутствием опушения листьев и черешков. М. Т. Мазуренко (1989) выделила их в ранге подвида — *V. uliginosum* subsp. *khokhrjakovii*, однако до изучения мелколистных форм в разных частях ареала голубики в Европе ($2n = 48$) выделение подвидов преждевременно.

4 (979). **V. arctostaphylos** L. 1753, Sp. Pl.: 351.

Описан из северной Турции. *Lectotypus* (Stevens, 1978: 102): Herb. Linn. 497.14, «Turcika, cappadocica, Tournefort» (LINN).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ЗЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Месх.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (верховья р. Пшиш); **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980, 2: 281).

Юго-Вост. Европа (горы Странджа); Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Fam. 59. **EMPETRACEAE** Hook. et Lindl., nom. cons.*

(*Ericaceae* Juss. subfam. *Empetroideae* Sweet: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 192)

1 (180). **Empetrum** L.

1 (980). **E. caucasicum** Juz. 1955, Список раст. Герб. фл. СССР, 13, 79: 79 (in adnot. № 3923. *E. hermaphroditum* (Lange) Hagerup); В. Н. Васил. 1961, Род *Empetrum*: 62, табл. 13; Фёд. 1962, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 6: 100, cum auct. (V. N. Vassil.) Juz. — *E. androgynum* V. N. Vassil. 1947, Реф. науч.-исслед. работ за 1945 г.: Отд. биол. наук АН СССР: 3, р. р. — *E. androgynum* var. *caucasicum* V. N. Vassil. 1949, Фл. СССР, 14: 516, in adnot., nom. nud. — *E. nigrum* L. subsp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher, 1952, Meddel. Grønland, 147, 9: 81, р. р.; R. R. Mill, 1982, Fl. Turk. 7: 632, р. р. — *E. nigrum* subsp. *caucasicum* (Juz.) Kuvaeв, 1996, Бот. журн. 81, 10: 113. — *E. nigrum* auct. fl. cauc. non L.: Е. А. Буш, 1911, Мат. Крым.-Кавк. фл. 3, 8: 10. — *E. hermaphroditum* auct. fl. cauc. non Hagerup: Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 527.

Описан с Западного Кавказа (верховья истоков Кубани). *Turpus*: «Kuban prov. Верховья западного истока Черю-кола [«Черко-кола» — ошибка], альп. пояс, 4 VIII 1907, № 766, пл., N. A. Busch, Iter caucasicum VIII» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Туап.-Адл. (Фишт); **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Н. Н. Цвелёв (1980) считает, что *E. caucasicum* происходит от гибридизации *E. hermaphroditum* с *E. subholarcticum* V. N. Vassil. На Кавказе встречаются популяции, приближающиеся по форме листьев то к одному, то к другому из предполагаемых родительских видов, которые оба имеют обоеполые цветки.

* Т. Н. Попова, Н. Н. Цвелёв.