

Европа; Средиз.; Азия; Африка; Америка. Повсюду, кроме пустынь, степей, полярных районов.

2.(25). **P. tauricum** V. Krecz. ex Grossh. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1 : 35. — *Allosorus tauricus* C. Presl, 1836, Tent. Pteridogr. : 154, nom. nud. — *Pteris aquilina* L. 1753, Sp. Pl. : 1075, p.p., excl. typo; Boiss. 1884, Fl. Or. 5 : 728; Альбов, 1895, Матер. фл. Колх. : 270; Липский, 1899, Фл. Кавк. : 499. — *Pteris aquilina* f. *transcaucasica* Rupr. 1845, Distr. Cryptog. Vasc. 3 : 46. — *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, 1879, in Kersten, Reise Ost. Afr. Bot. 3, 3 : 11, p.p., excl. typo; Фомин, 1934, Фл. СССР, 4 : 83; Колак. 1938, Фл. Абх. 1 : 39; Сосн. 1941, Фл. Груз. 1 : 35; Дмитриева, 1960, Определ. раст. Адж. : 19; Долух. 1964, Определ. раст. Груз. 1 : 48. — *Pteridium aquilinum* f. *lanuginosum* auct. non Hook. : 1851; Фомин, 1911, Матер. фл. Кавк. 1, 1 : 162. — *Pteris lanuginosa* auct. non Vory, 1810 : Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1 : 16.

Описан из Тальша (sub *Pteris aquilina* f. *transcaucasica* Rupr.). Тип: «Swant. Drych. Hohenacker» (LE!).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ:** Месх.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Косенко, 1970 : 20; Галушко, 1978 : 31); **ЦК:** В. Кум. (Кравцун, 1983 : 103; Танфильев, Кононов, 1987 : 9); **ВК:** В. Сулак. (Аскеров, Раджи, 1980 : 91–92); **ЮЗ:** Занг. (Gabrieljan, Greuter, 1984: 155), Ю. Караб. (Аскеров, 1977a : 1024).

Юго-Вост. Европа (Крым).

В 1939 г. вид *Pteridium tauricum* узаконен А. А. Гроссгеймом ссылкой на описание Ф. И. Рупрехта (*Pteris aquilina* f. *transcaucasica* Rupr.), при котором указан единственный гербарный образец Р. Ф. Гогенакера, принятый как тип (Бобров А., 1974 : 95).

### 3.(11). *Cryptogramma* R. Br.

1.(26). **C. crispa** (L.) R. Br. ex Hook. 1842, Gen. Fil.: tab. 115 B. — *Osmunda crispa* L. 1753, Sp. Pl.: 1067. — *Allosorus crispus* (L.) Bernh. 1806, Journ. Bot. (Götting.) 1, 2 : 36; Boiss. 1884, Fl. Or. 5 : 726; Альбов, 1895, Матер. фл. Колх. : 270; Липский, 1899, Фл. Кавк.: 499.

Описан из Европы (Англия, Швейцария).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.- Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.- Агрич., Мург.-Муровд.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978 : 32).

Атл., Сев., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Афганистан).

### 4.(12). *Cheilanthes* Sw.

1.(27). **C. pteridioides** (Reichard) C. Chr. 1905, Ind. Fil.: 178. — *Polypodium pteridioides* Reichard, 1780, in L. f. Syst. Veg., ed. 4 : 424. — *Cheilanthes fragrans* (L. f.) Sw. 1806, Syn. Fil. : 127, 325; Henders., 1965, Fl. Turk. 1 : 41; Wendelbo, 1976, Iran. Journ. Bot. 11 : 13. — *C. maderensis* auct. non Lowe, 1838 : Jermy et A. M. Paul, 1993, Fl. Europ., ed. 2, 1 : 12.

Описан из Средиземноморья.

**ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан.