

## Superordo Primulanae

### ORDO 23. STYRACALES (*EBENALES*)

Fam. 60. **EBENACEAE** Gürke, nom. cons.\*

Subfam. EBENOIDEAE Thorne et Reveal

#### 1 (181). **Diospyros** L.

1 (981). **D. lotus** L. 1753, Sp. Pl.: 1057.

Описан по культивированным экземплярам из южной Франции, Италии и Мавритании.

**T.**

Натурализовался и культивируется в **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. (от сев. Турции до сев. Пакистана), Ср. (юг), Вост. (Китай, Корея), Южн. (Непал) Азия. Натурализовался в Юго-Вост. Европе (Балканский п-ов, Крым); Средиз.; Японии. Широко культивируется в странах с теплоумеренным климатом.

На Кавказе произрастает дико только в Тальше, где основные массивы хурмовых лесов (с выраженным ярусом из *D. lotus*) сосредоточены в нижнем и среднем горных поясах.

В культуре известно большое количество сортов и форм.

2 (982). **D. virginiana** L. 1753, Sp. Pl.: 1057.

Описан из Северной Америки.

**ЗЗ**; **T.** Изредка культивируется.

Сев. Америка. В культуре в Юго-Вост. Европе; Ср. Азии.

3 (983). **D. kaki** L. f. 1781, Suppl. Pl.: 439.

Описан по культурным экземплярам из Японии.

**СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Н. Кур., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ**: Мегр.-Зан.; **T.** Культивируется.

Вост. (Китай: юг), Юго-Вост. (Китай, Мьянма) Азия. Натурализовался в Японии. Широко культивируется в странах с теплоумеренным климатом.

В культуре представлен большим количеством сортов и форм.

---

\* Н. Н. Имханицкая.