

Указан для всех районов Кавказа (Липский, 1899: 383); **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЦК**: Малк., В. Тер. (Галушко, 1980: 289; Танфильев, Кононов, 1987: 89); **ВК**: В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 180); **ЦЗ**: Лори; **ЮЗЗ**: Месх., Араг.; всех районов Грузии (Лачашвили, 1985: 88); **ЮЗ**: Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан. (Капеллер, 1952: 64; Смольянинова, 1967: 181; Фёдоров, 1973: 52).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Вост., Южн. Азия; Сев. Америка (заносное).

2 (1025). **A. foemina** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 2; Галушко, 1980, Фл. Сев. Кавк. 2: 289. — *A. caerulea* Schreb. 1771, Spic. Fl. Lips.: 5, nom. illeg., non L. 1759; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 213; Смольян. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 181. — *A. foemina* (Mill.) Schinz et Thell. 1907, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 7: 497; Тахт. и Фёд. 1972, Фл. Ерев.: 136.

Описан из Европы.

**ЗП**; **ЗК**: Адаг.-Пшиш.; **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**; **ЮЗЗ**: Месх.; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Уруп.-Теб.; **ЦК**: Малк.; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак. (Капеллер, 1952: 65; Галушко, 1980: 289); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах.; всех районов Грузии (Лачашвили, 1985: 89); **ЮЗ**: Севан., Дар. (Кузнецов, 1901: 161; Капеллер, 1952: 65; Смольянинова, 1967: 181; Фёдоров, 1973: 52).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Вост. Азия.

### Subfam. 3. CYCLAMINOIDEAE O. Schwarz\*

#### 10 (191). **Cyclamen** L.

##### Sect. 1. **Cyclamen**

1 (1026). **C. purpurascens** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 2. — *C. europaeum* L. 1753, Sp. Pl.: 145, nom. rej. — *C. europaeum* var. *ponticum* Albov, 1894, Bull. Herb. Boiss. 2: 254. — *C. europaeum* var. *colchicum* Albov, 1895, Тр. Тифл. бот. сада, 1: 166. — *C. colchicum* (Albov) Albov, 1898, Wiener Ill. Gart.-Zeitung, 23: 7. — *C. europaeum* subsp. *ponticum* (Albov) O. Schwarz, 1938, Gartenflora, ser. 2, 1: 11. — *C. ponticum* (Albov) Pobed. 1948, Бот. журн. 33, 2: 223.

Описан из Европы.

**ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион.

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа.

##### Sect. 2. **Psilanthum** O. Schwarz

2 (1027). **C. coum** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 6. — *C. coum* subsp. *hiemale* (Hildebr.) O. Schwarz, 1955, Feddes Repert. 58, 1–3: 249.

Описан по культивированному материалу, происходящему, по-видимому, с о. Кос Эгейского моря.

**ЗК**: Адаг.-Пшиш., Бело -Лаб.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия).

\* Ю. Л. Меницкий, Г. Ю. Конечная (Меницкий, 2000).

3 (1028). *C. vernum* Sweet, 1823, Brit. Fl. Gard. 1: tab. 9. — *C. vernale* C. Koch, 1843, Linnaea, 17: 308.

Описан по культивированному в Ботаническом саду Кью образцу, происходящему, по-видимому, из Грузии. Lectotypus (Menitsky, hoc loco): [Icon] R. Sweet, 1823, Brit. Fl. Gard. 1: tab. 9.

3а. *C. vernum* Sweet var. *vernum*. — *C. europaeum* L. var. *caucasicum* C. Koch, 1850, Linnaea, 23: 619. — *C. elegans* Boiss. et Buhse, 1857, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 30: 327; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 214. — *C. coum* Mill. β. *ibericum* Steven ex Boiss. 1875, Fl. Or. 4: 11; Кузн. 1901, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 166. — *C. ibericum* Steven ex Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 214. — *C. vernum* var. *caucasicum* (C. Koch) O. Schwarz, 1938, Gartenflora, ser. 2, 1: 20. — *C. adzharicum* Pobed. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 13: 189; Побед. 1952, Фл. СССР, 18: 288. — *C. coum* subsp. *caucasicum* (C. Koch) O. Schwarz, 1955, Feddes Repert. 58: 250; Wendelbo, 1965, in Rech. f. Fl. Iran. 9: 30. — *C. coum* var. *caucasicum* (C. Koch) Meikle, 1978, Fl. Turk. 6: 133. — *C. europaeum* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 140.

**ВК:** Кубин.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **Т:**

Указан для **ЦЗ:** Лори (Гроссгейм, 1932: 214); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Фёдоров, 1973: 56).

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

3б. *C. vernum* Sweet var. *abchasicum* (Medw. ex Kusn.) Menitzky, 2000, Бот. журн. 85, 6: 166. — *C. coum* Mill. var. *abchasicum* Medw. ex Kusn. 1902, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 167. — *C. abchasicum* (Medw. ex Kusn.) Kolak. 1948, Фл. Абх. 3: 274. — *C. circassicum* Pobed. 1948, Бот. журн. 33, 2: 226; Побед. 1952, Фл. СССР, 18: 285. — *C. calcareum* Kolak. 1949, Бюлл. Главн. бот. сада АН СССР, 3: 83.

Описан из Абхазии («Окр. Сухума. Медв.»).

**ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.

Эндемик.

## Superordo Violanae

### ORDO 25. VIOLALES

Fam. 62. **VIOLACEAE** Batsch, nom. cons.\*

Subfam. **VIOLOIDEAE** Beilschm.

1 (192). **Viola** L.

Subgen. 1. **Viola**

Sect. 1. **Trigonocarpea** Godr.

Subsect. 1. **Rosulantes** (Borbás) Juz.

1 (1029). **V. rupestris** F. W. Schmidt, 1794, Abh. Böhm. Ges. Wiss. (Math.-Nat.), 1: 60; Valentine et al. 1968, Fl. Europ. 2: 274, quoad subsp. *rupestris*. — *V. arenaria*

\* В. В. Никитин (Никитин, 1996, 1998).