

17 (1000). **P. luteola** Rupr. 1863, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 6: 233.

Описан с Восточного Кавказа. *Lectotypus* (Меницкий, 2000: 158; Фёдоров, 1949, in sched. herb. LE): «Caucasus orient., Dagestania superior montosa, inter Kidero et Kituri, 1250–1270 hexar., 12 VIII 1860, Ruprecht» (LE!; isolectotypus — TGM).

**БК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Давлианидзе, 1985: 67).

Эндемик.

18 (1001). **P. tournefortii** Rupr. 1863, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 6: 230. — *P. auriculata* Lam. f. *tournefortii* (Rupr.) Kusn. 1901, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 108. — *P. auriculata* auct. non Lam.: Boiss. 1875, Fl. Or. 4: 28; Wendelbo, 1965, in Rech. f. Fl. Iran. 9: 8; Фёд. 1973, Фл. Арм. 6: 32; A. J. Richards, 1993, *Primula*: 211.

Описан с «Востока». *Typus*: «*Primula veris orientalis caule altissimo folio angustissimo! flore umbellato purpureo*: Tourn. Coroll. 1719 p. 5. Herb. Vaillant von Ventenat» (P?); *paratypi*: «In Persiae, prov. Ghilan, Hablitzl, Herb. Gmel. Jun.; Armenien, Aucher-Eloy; Persien, Kotschy; Taurus, Kotschy» (?).

**ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Иран).

#### Sect. 6. **Crystallophlomis** (Rupr.) Fed.

19 (1002). **P. bayernii** Rupr. 1863, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 6: 238. — *P. nivalis* Pall. var. *bayernii* (Rupr.) Regel, 1874, Тр. Петерб. бот. сада, 3: 136; Кузн. 1901, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 113. — *P. crassifolia* Lehm. 1817, Monogr. Primul.: 91; A. J. Richards, 1993, *Primula*: 176. — *P. nivalis* auct. non Pall.: Ledeb. 1847, Fl. Ross. 3: 10, p. p. — *P. nivalis* var. *farinosa* auct. non (L.) Schrenk: Boiss. 1875, Fl. Or. 4, 1: 28.

Описан по материалам с Центрального и Восточного Кавказа. *Lectotypus* (Давлианидзе, 1985: 68, «*typus*»; Фёдоров, 1949, in sched.): «*Chewsuria, regio alpina, prope nivei ad fontes fl. Archot, in via a Roschki[o]ni ad Quiris-zminda, in latere boreali jugi Archotensi, in terra nigra, haud uliginosa, detexit Bayern, 28 VII 1861*» (LE!).

**ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг.

Указан для **ЦК:** В. Кум.; **БК:** Ман.-Самур. (Снеговой хр., перевал Ягодак) (Муртазалиев, 2009, 1: 174); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Кузнецов, 1901: 114; Фёдоров, 1952: 191; Смольянинова, 1967: 166; Давлианидзе, 1985: 68).

Эндемик.

#### 2 (183). **Sredinskya** (Stein) Fed.\*

1 (1003). **S. grandis** (Trautv.) Fed. 1951, Бот. мат. (Ленинград), 13: 201. — *Primula grandis* Trautv. 1866, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 10: 395.

Описан из Западного Закавказья (Сванетия). *Typus*: «*Dadiasch, 23 VI 1865, G. Radde*», (LE!; *isotypi* — TBI, TGM).

\* Ю. Л. Меницкий, Г. Ю. Конечная (Меницкий, 2000).

**ЦК:** Малк.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Галушко, 1980: 286); **ЗЗ:** Туап.- Адл. (Зернов, 2006: 434).

Эндемик.

## Trib. 2. **Androsaceae** Rchb. ex Pax\*

### 3 (184). **Androsace** L.

#### Sect. 1. **Chamaejasme** C. Koch

1 (1004). **A. villosa** L. 1753, Sp. Pl.: 142. — *A. barbulata* Ovcz. 1952, Фл. СССР, 18: 728, 225.

Описан по материалам с Альп и Пиринеев.

1а. **A. villosa** L. var. **villosa**. — *A. penicillata* Schott, Nyman et Kotschy, 1854, in Schott, Analect. Bot.: 18; Boiss. 1875, Fl. Or. 4: 13, cum auct. Schott. — *A. arachnoidea* Schott, Nyman et Kotschy, 1854, l. c.: 17; Капеллер, 1952, Фл. Груз. 7: 53; Смольян. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 169. — *A. villosa* var. *arachnoidea* (Schott, Nyman et Kotschy) R. Knuth, 1905, in Engl. Pflanzenr. 22, 4, 237: 193; Смольян. 1973, Фл. Арм. 6: 37.

**ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Указан для **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Дар. (Прилипко, 1957: 28; Смольянинова, 1967: 170, 1973: 37); для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 286).

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Вост., Южн. Азия.

1b. **A. villosa** L. var. **dasyphylla** (Bunge) Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15: 249. — *A. dasyphylla* Bunge, 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 218. — *A. odoratissima* Schreb. 1766, Icon. Descr. Pl. 1: 7–8, tab. 4. — *A. olympica* Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 4: 37; Капеллер, 1952, Фл. Груз. 7: 52. — *A. villosa* var. *congesta* Boiss. 1875, Fl. Or. 4: 14.

Описан с Алтая.

**ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.

Сев. (юг), ?Юго-Зап. (Турция, сев. Иран), Ср., Центр. (Монголия) Азия.

2 (1005). **A. chamaejasme** Wulfen ex Host, 1797, Syn. Pl. Austr.: 95; Wulfen, 1787, in Jacq. Collectanea, 1: 194, nom. inval. — *A. lehmanniana* Spreng. 1817, in Oken, Isis, 1, 9, 162: 1289, tab. 9; Шишк. и Бобр. 1952, Фл. СССР, 18: 232.

Описан из Австрии.

**ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

\* Ю. Л. Меницкий, Г. Ю. Конечная (Меницкий, 2000).