

**ЦК:** Малк.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Галушко, 1980: 286); **ЗЗ:** Туап.- Адл. (Зернов, 2006: 434).

Эндемик.

## Trib. 2. **Androsaceae** Rchb. ex Pax\*

### 3 (184). **Androsace** L.

#### Sect. 1. **Chamaejasme** C. Koch

1 (1004). **A. villosa** L. 1753, Sp. Pl.: 142. — *A. barbulata* Ovcz. 1952, Фл. СССР, 18: 728, 225.

Описан по материалам с Альп и Пиринеев.

1а. **A. villosa** L. var. **villosa**. — *A. penicillata* Schott, Nyman et Kotschy, 1854, in Schott, Analect. Bot.: 18; Boiss. 1875, Fl. Or. 4: 13, cum auct. Schott. — *A. arachnoidea* Schott, Nyman et Kotschy, 1854, l. c.: 17; Капеллер, 1952, Фл. Груз. 7: 53; Смольян. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 169. — *A. villosa* var. *arachnoidea* (Schott, Nyman et Kotschy) R. Knuth, 1905, in Engl. Pflanzenr. 22, 4, 237: 193; Смольян. 1973, Фл. Арм. 6: 37.

**ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Указан для **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Дар. (Прилипко, 1957: 28; Смольянинова, 1967: 170, 1973: 37); для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 286).

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Вост., Южн. Азия.

1b. **A. villosa** L. var. **dasyphylla** (Bunge) Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15: 249. — *A. dasyphylla* Bunge, 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 218. — *A. odoratissima* Schreb. 1766, Icon. Descr. Pl. 1: 7–8, tab. 4. — *A. olympica* Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 4: 37; Капеллер, 1952, Фл. Груз. 7: 52. — *A. villosa* var. *congesta* Boiss. 1875, Fl. Or. 4: 14.

Описан с Алтая.

**ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.

Сев. (юг), ?Юго-Зап. (Турция, сев. Иран), Ср., Центр. (Монголия) Азия.

2 (1005). **A. chamaejasme** Wulfen ex Host, 1797, Syn. Pl. Austr.: 95; Wulfen, 1787, in Jacq. Collectanea, 1: 194, nom. inval. — *A. lehmanniana* Spreng. 1817, in Oken, Isis, 1, 9, 162: 1289, tab. 9; Шишк. и Бобр. 1952, Фл. СССР, 18: 232.

Описан из Австрии.

**ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

\* Ю. Л. Меницкий, Г. Ю. Конечная (Меницкий, 2000).

Указан для **ЗК**: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: В. Кум. (Кузнецов, 1901: 126–127; Капеллер, 1952: 54; Танфильев, Кононов, 1987: 79); **ВЗ**: Алаз.-Агрич. (Прилипко, 1957: 29); **ЮЗ**: Севан. (Смолянинова, 1973: 39).

Европа; Сев., ?Юго-Зап. (Турция), Центр., Вост., Южн. Азия; Сев. Америка.

#### Sect. 2. *Megista* Schldl.

3 (1006). *A. maxima* L. 1753, Sp. Pl.: 141.

Описан из Франции.

За. *A. maxima* L. subsp. *caucasica* (Kusn. ex Grossh.) Fed. 1972, в Тахт. и Фёд. Фл. Ерев.: 136. — *A. maxima* var. *caucasica* Kusn. ex Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 210; Кузн. 1901, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 141, nom. prov. — *A. turczaninowii* auct. non Freyn: Шишк. и Бобр. 1952, Фл. СССР, 18: 242, quoad pl. cauc.

Описан с Кавказа. Lectotypus (Меницкий, 2000: 161): «In Armenia ruthenica, prope Etschmiadsin, 1837, № 410, Dr. Koch» (LE!).

**ЗП**: Аз.-Куб.; **ВП**; **ЗК**: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ**: Месх.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Смолянинова, 1967: 172); всех не лесных районов Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 80); **ВЗ**: Иорск.-Шек. (Прилипко, 1957: 31); **ЮЗЗ**: Араг. (Смолянинова, 1973: 39).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

#### Sect. 3. *Androsace*

4 (1007). *A. albana* Steven, 1812, Mém. Soc. Nat. Moscou, 3: 255. — *A. longifolia* C. Koch, 1850, Linnaea, 23: 610. — ?*A. bidentata* C. Koch, 1850, l. c.: 610 (fide Ovcz. in herb. LE); Шишк. и Бобр. 1952, Фл. СССР, 18: 237. — *A. wiedemannii* auct. non Boiss.: Шишк. и Бобр. 1952, цит. соч.: 237, pro syn. *A. bidentata* C. Koch; Капеллер, 1952, Фл. Груз. 7: 55; Смолян. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 170, pro spec.

Описан с Восточного Кавказа. Турпус: «Schahdagh, Steven» (H (H1602942)).

**ЗК**: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: В. Сулак., Кубин. (тип); **ЗЗ**: Туап.-Адл., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах., Араг.

Указан для **ЗК**: Уруп-Теб.; **ВК**: Ассо-Арг. (Смолянинова, 1967: 170; Галушко, 1980: 288; Воробьёва, Кононов, 1991: 92), Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 176); **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ**: Месх. (Кузнецов, 1901: 129; Капеллер, 1952: 55; Смолянинова, 1967: 170.).

Юго-Зап. Азия (сев. Турция, сев. Иран).

5 (1008). *A. armeniaca* Duby, 1844, in DC. Prodr. 8: 52.

Описан из Турции. Турпус: «In montibus Armeniae circa Erzeroum, Aucher» (G).

**ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах., Занг.

Указан для **ЦЗ**: Лори (Кузнецов, 1901: 131; Смольянинова, 1967: 170, 1973: 41).

Юго-Вост. Европа (Балканский п-ов); Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Иран).

6 (1009). **A. raddeana** Sommier et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 1: 49. — *A. caucasica* Sommier et Levier, 1892, Gard. Chron. 2: 399, nom. nud.

Описан по образцам, выращенным в Женеве из семян, собранных на западных склонах Эльбруса («...in excelsioribus alpinis montis Elbruz occid. supra moles glaciales pontium rivi Kukurtli 3400–3500 m... 10 IX 1890 [Sommier et Levier]»).

**ЗК**: В. Куб.; **ЦК**; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Месх., Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах., Занг.

Указан для **ЗК**: Уруп-Теб. (Галушко, 1980: 288); **ВК**: Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 177), Кубин.; **ВЗ**: Караб.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах. (Кузнецов, 1901: 133; Капеллер, 1952: 57; Прилипко, 1957: 30).

Эндемик.

7 (1010). **A. intermedia** Ledeb. 1847, Fl. Ross. 3: 20. — *A. armeniaca* auct. non Duby: Boiss. 1875, Fl. Or. 4: 15.

Описан из Западного Закавказья. Т у р u s: «In rupestribus reg. subalpini Guriae, Nordmann» (LE!).

**ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.  
Юго-Зап. Азия (Турция).

8 (1011). **A. septentrionalis** L. 1753, Sp. Pl.: 142.

Описан из Северной Европы.

**ЗК**: В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ерев.

Указан для **ЗК**: Уруп-Теб.; **ВК**: Ассо-Арг. (Капеллер, 1952: 57; Галушко, 1980: 288), Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 177).

Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев. Америка.

9 (1012). **A. elongata** L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 1668.

Описан из Германии.

**ЗП**; **ВП**: Тер.-Сулак.; **ЦК**: В. Кум.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Ерев.; **Т**.

Указан для **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг. (Смольянинова, 1967: 172; Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 117; Галушко, 1980: 288; Танфильев, Кононов, 1987: 80), Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 177); **СЗЗ**: Анап.-Гел. (Кузнецов, 1901: 137; Капеллер, 1952: 58; Смольянинова, 1967: 172); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт.; **ЮЗ**: Занг., Ю. Караб. (Капеллер, 1952: 58; Прилипко, 1957: 31; Смольянинова, 1973: 44).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Центр., Вост., Южн. Азия.

10 (1013). **A. filiformis** Retz. 1781, Observ. Bot. 2: 10.

Описан из Восточной Сибири.

Указан для **T** (Hultén, Fries, 1986, 2: 737, map 1473).  
Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Иран), Вост. Азия; Сев. Америка.

Trib. 3. **Samoleae** Rchb.\*

4 (185). **Samolus** L.

1 (1014). **S. valerandi** L. 1753, Sp. Pl.: 171.

Описан из Европы.

**ЗП; ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.; **БК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан.; **T:**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак. (Смольянинова, 1967: 182; Галушко, 1980: 288; Танфильев, Кононов, 1987: 80; Муртазалиев, 2009, 1: 177); **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 178); **ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев. (Кузнецов, 1901: 144; Смольянинова, 1973: 45).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Вост. Южн. Азия; Африка; Австралия.

Subfam. 2. **LYSIMACHIOIDEAE** Kostel.\*

Trib. 1. **Lysimachieae** Rchb.

5 (186). **Lysimachia** L.

Sect. 1. **Nummularia** (Hill) Klatt

1 (1015). **L. nummularia** L. 1753, Sp. Pl.: 148.

Описан из Европы.

**ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **БК:** Ассо-Арг.

Указан для **ЗП; ЦК:** Малк., В. Тер. (Кузнецов, 1901: 156; Смольянинова, 1967: 178; Галушко, 1980: 289; Танфильев, Кононов, 1987: 80); **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 179).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция), Ср. Азия; Сев. Америка (заносное).

Sect. 2. **Verticillatae** R. Knuth

2 (1016). **L. verticillaris** Spreng. 1807, Mantissa Prima Fl. Hal.: 36. — *L. verticillata* Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 141. — *L. punctata* L. var. *verticillata* (Vieb.) Boiss. 1875, Fl. Or. 4: 9; Кузн. 1901, Мат. фл. Кавк. 4, 1: 149.

Описан из Крыма.

**ЗП; ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг.

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 289); всех районов Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 80); **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЦЗ:** Триал.-Н.

\* Ю. Л. Меницкий, Г. Ю. Конечная (Меницкий, 2000).