

**33:** Туап.-Адл. (междуречье Агуры и Мацесты, сорные места), Абх. (с. Латы, в обрывах близ р. Кодор). Культивируется, дичает.

Указан для **33:** Инг.-Рион. (близ Кутаиси, «in muris antiquis») (Ledebour, 1843: 14, sub nom. *Lagenaria vulgaris*).

Родина, вероятно, Африка. В диком состоянии неизвестен. Культивируется в Центр. (редко), Южн., Вост. (юг) Европе; Юго-Зап. Азии; Африке; в других регионах с тропическим климатом.

#### 9 (207). *Citrullus* Schrad. ex Eckl. et Zeyh., nom. cons.

1 (1126). *C. colocynthis* (L.) Schrad. 1838, Linnaea, 12, 4: 414. — *Cucumis colocynthis* L. 1753, Sp. Pl.: 1011, non Thunb. 1794. — *Colocynthis vulgaris* Schrad. 1833, Index Sem. Horti Götting.: 2.

Описан по экземпляру, культивированному в Ботаническом саду в Упсале.

Указан как дикорастущий для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (песчаные берега Аракса близ Мегри) (Габриэлян и др., 1981: 77; Барсемян, 1989: 101).

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. (заносное, сорное), Вост., Южн. (зап., южн. Индия), Азия; Сев. Африка (включая Канарские о-ва) (Jeffrey, 1972: 202).

2 (1127). *C. lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai, 1916, Cat. Sem. Spor. Hort. Bot. Univ. Tokyo: 30, № 854; Mansf. 1959, Kulturpfl. 2: 421, comb. superfl. — *Momordica lanata* Thunb. 1794, Prodr. Pl. Capens. 1: 13. — *Citrullus vulgaris* Schrad. 1836, in Eckl. et Zeyh. Enum. Pl. Afr. Austral. 2: 279. — *C. edulis* Spach, 1838, Hist. Nat. Vég. 6: 214. — *C. aedulis* Pangalo, 1930, Тр. прикл. бот. ген. сел. 23, 3: 44. — *C. colocynthoides* Pangalo, 1930, цит. соч. 23, 3: 117.

Описан из Южной Африки.

**33:** Туап.-Адл. (пойма р. Чемитоквадже), Адж. (Кобулет, на литорали); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. («Prope urbem Tiflis, Kolenati» — в культуре). Культивируется на Кавказе как пищевое растение (арбуз культурный, столовый), дичает.

Южн., Юго-Зап. Африка. Широко культивируется в тропических и субтропических областях, дичает и натурализуется.

#### 10 (208). *Cucumis* L.

Subgen. 1. *Melo* (Mill.) C. Jeffrey

1 (1128). *C. melo* L. 1753, Sp. Pl.: 1011, s. l. — *C. melo* subsp. *melo*: Greb. 1959, in Mansf. Kulturpfl. 2: 425; C. Jeffrey, 1980, *Cucurb.* East. Asia: 20; Имхан. 2000, Бот. журн. 85, 1: 130. — *C. dudaim* L. 1753, Sp. Pl.: 1011. — *Melo dudaim* (L.) Sageret, 1826, Ann. Sci. Nat. (Paris), 8: 313. — *M. sativus* Sageret ex M. Roem. 1846, Fam. Nat. Syn. Monogr. 2: 68, in syn. ad *C. melo*. — *Cucumis melo* var. *dudaim* (L.) Naudin, 1859, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 4, 11: 69. — *C. melo* var. *microcarpus* Alef. 1866, Landw. Fl.: 8. — *C. melo* var. *cultis* Kurz, 1877, Journ. Asiat. Soc. Bengal. 46, 2: 103 («β. *culta*»), nom. superfl. — *Melo microcarpus* (Alef.) Pangalo, 1950, Бот. журн. 35, 6: 574. — *M. agrestis* (Naudin) Pangalo, 1950, цит. соч. 35, 6: 580, p. p.,

excl. typo. — *Cucumis melo* subsp. *dudaim* Greb. 1953, in Mansf. Kulturpfl. 1: 134. — *C. melo* var. *melo*: C. Jeffrey, 1980, Kew Bull. 34, 4: 794. — *C. melo* var. *agrestis* auct. fl. cauc. non Naudin, 1859: Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 414.

Описан по культивированным экземплярам неизвестного происхождения.

**ЗЗ:** Адж. (Кобулет, на литорали); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. («Prope urbem Tiflis, Kolenati» (LE!) — в культуре); **ВЗ:** Н. Кур., Караб. («Distr. Agdam, steppa Karabach, prope viae fer. Evlach» — LE!); **Т** (с. Ахсаглап).

Указан как дикорастущий и сорный для Кавказа (Chakravarty, Jeffrey, 1980: 205, sub nom. *C. melo*); **ВЗ:** Ширв. (Гроссгейм, 1934: 60, sub nom. *C. melo*), Мург.-Муровд. (Hohenacker, 1833: 246; Ledebour, 1843: 142; Фомин, 1903: 144; Гроссгейм, 1934: 60, sub nom. *C. melo*); **ЮЗ:** Ерев. (sub nom. *M. agrestis*: долина Аракса — Мулкиджанян, 1966: 53; Араратская долина — Хачатрян, 1950: 113), Мерг.-Зан. (Мерги) (Хачатрян, 1950: 113, sub nom. *M. agrestis*).

Юго-Зап. (Турция, Сирия, Палестина, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

На Кавказе представлен типовым подвидом.

2 (1129). **C. myriocarpus** Naudin, 1859, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 4, 11: 22; C. Jeffrey, 1962, Kew Bull. 15, 3: 350. — *C. prophetarum* Jacq. 1770, Hort. Bot. Vindob. 1: 3, tab. 9, non L. 1755. — *C. myriocarpus* subsp. *myriocarpus*: C. Jeffrey a. P. Halliday, 1975, in C. Jeffrey, Kew Bull. 30, 3: 481.

Описан по культивированным образцам, привезенным из Южной Африки.

**ВП:** Тер.-Кум. («[Ногайская степь] в 30 км к вост. от Ачикулака, сорное близ усадьбы 2-ой Горькоозерной дачи, 16 VIII 1949, № 626, Н. В. Новопокровский» — LE!). Заносное, сорное.

Африка. Разводится в ботанических садах Европы, дичает.

На Кавказе представлен типовым подвидом (Имханицкая, 2000: 131).

## Subgen. 2. *Cucumis*

3 (1130). **C. sativus** L. 1753, Sp. Pl.: 1012. — *C. sativus* var. *sativus*: C. Jeffrey, 1980, *Cucurb.* East. Asia: 22.

Описан по культивированному экземпляру.

**БК:** Кубин. («Близ с. Кусары, VII 1900, С. Г. Григорьев» — LE!). Повсеместно разводится на Кавказе как овощное растение (огурец посевной), иногда дичает.

Вост. (Китай: юг), Юго-Вост., Южн. Азия. В диком состоянии неизвестен. Широко культивируется в умеренных, субтропических и тропических областях.

## Trib. 7. *Cucurbiteae* Dumort.

### 11 (209). *Cucurbita* L.

1 (1131). **C. maxima** Duchesne ex Lam. 1786, Encycl. Méth. Bot. 2, 1: 151.

Описан по культурному экземпляру неизвестного происхождения.

**ЗЗ:** Абх. («Цебельда [Юрьевское], около укрепл. Цебельдинск., между камнями разруш. крепости, 27 VII 1868, № 82, Г. Ф. Шперк, Л. В. Рейнгардт» — LE!).