

excl. typo. — *Cucumis melo* subsp. *dudaim* Greb. 1953, in Mansf. Kulturpfl. 1: 134. — *C. melo* var. *melo*: C. Jeffrey, 1980, Kew Bull. 34, 4: 794. — *C. melo* var. *agrestis* auct. fl. cauc. non Naudin, 1859: Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 414.

Описан по культивированным экземплярам неизвестного происхождения.

**ЗЗ:** Адж. (Кобулет, на литорали); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. («Prope urbem Tiflis, Kolenati» (LE!) — в культуре); **ВЗ:** Н. Кур., Караб. («Distr. Agdam, steppa Karabach, prope viae fer. Evlach» — LE!); **Т** (с. Ахсагла).

Указан как дикорастущий и сорный для Кавказа (Chakravarty, Jeffrey, 1980: 205, sub nom. *C. melo*); **ВЗ:** Ширв. (Гроссгейм, 1934: 60, sub nom. *C. melo*), Мург.-Муровд. (Hohenacker, 1833: 246; Ledebour, 1843: 142; Фомин, 1903: 144; Гроссгейм, 1934: 60, sub nom. *C. melo*); **ЮЗ:** Ерев. (sub nom. *M. agrestis*: долина Аракса — Мулкиджанян, 1966: 53; Араратская долина — Хачатрян, 1950: 113), Мерг.-Зан. (Мерги) (Хачатрян, 1950: 113, sub nom. *M. agrestis*).

Юго-Зап. (Турция, Сирия, Палестина, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

На Кавказе представлен типовым подвидом.

2 (1129). **C. myriocarpus** Naudin, 1859, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 4, 11: 22; C. Jeffrey, 1962, Kew Bull. 15, 3: 350. — *C. prophetarum* Jacq. 1770, Hort. Bot. Vindob. 1: 3, tab. 9, non L. 1755. — *C. myriocarpus* subsp. *myriocarpus*: C. Jeffrey a. P. Halliday, 1975, in C. Jeffrey, Kew Bull. 30, 3: 481.

Описан по культивированным образцам, привезенным из Южной Африки.

**ВП:** Тер.-Кум. («[Ногайская степь] в 30 км к вост. от Ачикулака, сорное близ усадьбы 2-ой Горькоозерной дачи, 16 VIII 1949, № 626, Н. В. Новопокровский» — LE!). Заносное, сорное.

Африка. Разводится в ботанических садах Европы, дичает.

На Кавказе представлен типовым подвидом (Имханицкая, 2000: 131).

## Subgen. 2. *Cucumis*

3 (1130). **C. sativus** L. 1753, Sp. Pl.: 1012. — *C. sativus* var. *sativus*: C. Jeffrey, 1980, *Cucurb.* East. Asia: 22.

Описан по культивированному экземпляру.

**БК:** Кубин. («Близ с. Кусары, VII 1900, С. Г. Григорьев» — LE!). Повсеместно разводится на Кавказе как овощное растение (огурец посевной), иногда дичает.

Вост. (Китай: юг), Юго-Вост., Южн. Азия. В диком состоянии неизвестен. Широко культивируется в умеренных, субтропических и тропических областях.

## Trib. 7. *Cucurbiteae* Dumort.

### 11 (209). *Cucurbita* L.

1 (1131). **C. maxima** Duchesne ex Lam. 1786, Encycl. Méth. Bot. 2, 1: 151.

Описан по культурному экземпляру неизвестного происхождения.

**ЗЗ:** Абх. («Цебельда [Юрьевское], около укрепл. Цебельдинск., между камнями разруш. крепости, 27 VII 1868, № 82, Г. Ф. Шперк, Л. В. Рейнгардт» — LE!).

Выращивается на Кавказе как пищевое и кормовое растение (тыква крупная), дичает.

Южн. Америка. В диком состоянии неизвестен. Разводится во многих странах мира.

## ORDO 29. BEGONIALES (*DATISCALES*)

Fam. 68. **DATISCACEAE** Dumort., nom. cons.\*

1 (210). **Datisca** L.

1 (1132). **D. cannabina** L. 1753, Sp. Pl.: 1037.

Описан с Крита.

**БК:** В. Сулак. (юг), Кубин. (юг); **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан. (с. Вагравар), Ю. Караб.; **Т** (горы).

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1978: 230).

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ливан, Ирак, сев. Иран, сев.-зап. Афганистан, Пакистан); Ср., Южн. (Гималаи) Азия.

## Superordo Brassicanae

ORDO 30. CAPPARALES (*BRASSICALES*)

Fam. 69. **CAPPARACEAE** Juss., nom. cons.\*\*

Subfam. 1. CAPPAROIDEAE Burnett

(*Capparaceae* Juss.: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 252)

Trib. **Cappareae** DC.

1 (211). **Capparis** L.

1 (1133). **C. herbacea** Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol.: 560; Станков, 1947, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 1: 319; Цвел. 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 29. — *C. ovata* Desf. var. *herbacea* (Willd.) Zohary, 1960, Bull. Res. Council Israel. Sect. D. Bot. 2: 56; Coode, 1965, Fl. Turk. 1: 497. — *C. sicula* Veill. subsp. *herbacea* (Willd.) Inocencio, D. Rivera, Obón et Alcaraz, 2006, Ann. Missouri Bot. Gard. 93, 1: 140. — *C. spinosa* auct. non L.: Бобр. 1939, Фл. СССР, 8: 2; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 404; Прилипко, 1953, Фл. Азерб. 4: 324; Мулк. 1966, Фл. Арм. 5: 57; Hedge a. Lamond, 1970, in Rech. f. Fl. Iran. 68: 5; Кут. 1979, Фл. Груз. изд. 2, 5: 229; Галушко, 1980, Фл. Сев. Кавк. 2: 65.

Описан с Кавказа («ad Caucasam»).

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Юго-Вост. Европа (Балканский п-ов, Крым); Юго-Зап., Ср. Азия.

\* Т. Г. Леонова.

\*\* Н. Н. Цвелёв.