

**ЗП:** Аз.-Куб. (Таманский п-ов); **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Абх. (Цебельда), Инг.-Рион. (Поти); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ю. Караб. (Шахбулаг); **Т.**

Указан для всех районов Кавказа (Липский, 1899: 309; Васильченко, 1957: 110; Прилипко, 1961: 115; Мулкиджанян, 1966: 50); **ЗП;** **ВП** (Гроссгейм, 1949: 413; Галушко, 1980: 137); Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 99); **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Иванов, 1997: 115), Тер.-Сулак. (Meyer, 1831: 83, sub nom. *Momordica elaterium*; Ledebour, 1843: 141, sub nom. *Ecballium elaterium*); **ЗК** (Гроссгейм, 1949: 413); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб. (Галушко, 1980: 137); **ЦК:** В. Кум. (Георгиевск) (Шмальгаузен, 1895: 377); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Галушко, 1980: 137); **ЦЗ:** Лори (Гроссгейм, 1934: 60); **ЮЗЗ** (Гроссгейм, 1949: 413); **ЮЗ:** («на севере») (Гроссгейм, 1949: 413), Ерев. (Эчмиадзин) (Мулкиджанян, 1966: 50; Тахтаджян, Фёдоров, 1972: 107), Нах. (Прилипко, 1961: 115).

Юго-Вост. (Крым), Вост. (юг) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан, Палестина, сев.-зап. Иран); Азорские о-ва.

### Trib. 3. **Thrichosantheae** C. Jeffrey

#### 4 (202). **Trichosanthes** L.

1 (1120). **T. kirilowii** Maxim. 1859, Mém. Sav. Étr. Pétersb. 9: 482 (Prim. Fl. Amur. Suppl. 2). — *T. kirilowii* var. *kirilowii*: C. Jeffrey, 1980, *Cucurb.* East. Asia: 46.

Описан из Северного Китая.

Указан для **СЗЗ:** Туап.-Адл. (Адлер) (Имханицкая, 2000: 132). На Кавказе культивируются растения типовой разновидности, иногда дичают.

Вост. Азия (Сев., Сев.-Вост. Китай; Корея; Япония) (Jeffrey, 1980: 46).

### Trib. 4. **Luffeae** C. Jeffrey

#### 5 (203). **Luffa** Mill.

1 (1121). **L. aegyptiaca** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8. — *L. cylindrica* (L.) M. Roem. 1846, Fam. Nat. Syn. Monogr. 2: 63; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 413; Вас. 1957, Фл. СССР, 24: 99; Прилипко, 1961, Фл. Азерб. 8: 112. — *Momordica cylindrica* L. 1753, Sp. Pl.: 1009.

Описан из Китая и с Цейлона.

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **Т** (Гроссгейм, 1949: 413; Прилипко, 1961: 112). Культивируется, дичает.

Юго-Зап., Вост. (Китай), Южн. (Цейлон) Азия; Сев. Африка (Египет). Широко культивируется в тропических и субтропических областях.

2 (1122). **L. acutangula** (L.) Roxb. 1814, Hort. Bengal.: 70; id. 1832, in Carey, Fl. Ind. 3: 713. — *Cucumis acutangulus* L. 1753, Sp. Pl.: 1011 («*acutangula*»).

Описан, по-видимому, по культурным экземплярам из Восточной Европы и Китая.

**ВЗ:** Мург.-Муровд. («Helenendorf, Hohenacker» — LE!). Культивируется, дичает.

Указан для Кавказа («Hab. in vineis ad fl. Terek (Falk. — vix spontanea)») (Ledebour, 1843: 141).

Юго-Зап. (Пакистан), Юго-Вост., Южн. Азия. Широко культивируется в тропических и субтропических областях, дичает и натурализуется.

#### Trib. 5. **Sicyoeae** Schrad.

##### 6 (204). **Echinocystis** Torr. et A. Gray, nom. cons.

1 (1123). **E. lobata** (Michx.) Torr. et A. Gray, 1840, Fl. North Amer. 1: 542. — *Sicyos lobata* Michx. 1803, Fl. Bor.-Amer. 2: 217. — *Momordica echinata* Muhl. ex Willd. 1805, Sp. Pl. 4, 1: 605; Muhl. 1793, Trans. Amer. Philos. Soc. 3: 180, nom. nud. — *Echinocystis echinata* (Muhl. ex Willd.) Britton, Sterns et Poggenb. 1888, Prelim. Cat.: 20. — *E. echinata* (Muhl. ex Willd.) Vass. 1957, Фл. СССР, 24: 125, comb. superfl.

Описан из Северной Америки.

**ЗК:** Адаг.-Пшиш. (по р. Шебш); **ЦК:** В. Тер. (Владикавказ, террасы по лев. берегу Терека; прав. берег Урсдона). Заносное, сорное.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Ставрополь) (Иванов, 1997: 115); **ЗК:** Бело-Лаб.; **СЗЗ:** Туап.-Адл. (Г. Ю. Конечная, 1998, личн. сообщ.); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Хашури, Ананури, ущелье Арагви) (М. А. Иванишвили (ТВИ), 1990, личн. сообщ.); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (окр. Дилижана) (Ханджян, Шарбатян, 1999: 42).

Вост. Европа (натурализовался); Сев., Ср., Вост. Азия (натурализовался); Сев. Америка.

##### 7 (205). **Sicyos** L.

1 (1124). **S. angulatus** L. 1753, Sp. Pl.: 1013 («*angulata*»).

Описан по материалам из Канады и Мексики.

Указан для Кавказа (Ledebour, 1843: 143; Boissier, 1872: 763); **ЗЗ:** Абх. (окр. Очамчира) (Пахоменко, 1989: 196; Колаковский и др. 1990: 1454). Заносное, сорное.

Центр., Юго-Вост., Вост. (юг) Европа (натурализовался); Сев. Америка.

#### Trib. 6. **Benincaseae** Ser.

##### 8 (206). **Lagenaria** Ser.

1 (1125). **L. siceraria** (Molina) Standl. 1930, Publ. Field Mus. (Bot.), 3, 3: 435. — *Cucurbita siceraria* Molina, 1782, Sagg. Stor. Nat. Chili: 133. — *C. lagenaria* L. 1753, Sp. Pl.: 1010. — *Lagenaria vulgaris* Ser. 1825, Mém. Soc. Phys. Genève, 3, 1: 25.

Описан из Чили.