

Выращивается на Кавказе как пищевое и кормовое растение (тыква крупная), дичает.

Южн. Америка. В диком состоянии неизвестен. Разводится во многих странах мира.

ORDO 29. BEGONIALES (*DATISCALES*)

Fam. 68. **DATISCACEAE** Dumort., nom. cons.*

1 (210). **Datisca** L.

1 (1132). **D. cannabina** L. 1753, Sp. Pl.: 1037.

Описан с Крита.

ВК: В. Сулак. (юг), Кубин. (юг); **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан. (с. Вагравар), Ю. Караб.; **Т** (горы).

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1978: 230).

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ливан, Ирак, сев. Иран, сев.-зап. Афганистан, Пакистан); Ср., Южн. (Гималаи) Азия.

Superordo Brassicanae

ORDO 30. CAPPARALES (*BRASSICALES*)

Fam. 69. **CAPPARACEAE** Juss., nom. cons.**

Subfam. 1. CAPPAROIDEAE Burnett

(*Capparaceae* Juss.: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 252)

Trib. **Cappareae** DC.

1 (211). **Capparis** L.

1 (1133). **C. herbacea** Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol.: 560; Станков, 1947, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 1: 319; Цвел. 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 29. — *C. ovata* Desf. var. *herbacea* (Willd.) Zohary, 1960, Bull. Res. Council Israel. Sect. D. Bot. 2: 56; Coode, 1965, Fl. Turk. 1: 497. — *C. sicula* Veill. subsp. *herbacea* (Willd.) Inocencio, D. Rivera, Obón et Alcaraz, 2006, Ann. Missouri Bot. Gard. 93, 1: 140. — *C. spinosa* auct. non L.: Бобр. 1939, Фл. СССР, 8: 2; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 404; Прилипко, 1953, Фл. Азерб. 4: 324; Мулк. 1966, Фл. Арм. 5: 57; Hedge a. Lamond, 1970, in Rech. f. Fl. Iran. 68: 5; Кут. 1979, Фл. Груз. изд. 2, 5: 229; Галушко, 1980, Фл. Сев. Кавк. 2: 65.

Описан с Кавказа («ad Caucasam»).

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Юго-Вост. Европа (Балканский п-ов, Крым); Юго-Зап., Ср. Азия.

* Т. Г. Леонова.

** Н. Н. Цвелёв.