

СЗЗ; ЗЗ: Туап.-Адл.

Эндемик.

А. Carlström (1984) объединила этот вид с *C. iberica*, но отметила его значительное своеобразие. От *C. iberica* он отличается плодами с коротким (до 0.5 мм, а не 1–2.5 мм дл.) гинофором при более длинном (2–3.3, а не 0.5–1.2 мм дл.) носике.

Sect. 2. **Pedicellaria** DC.

6 (1139). **C. hassleriana** Chodat, 1898, Bull. Herb. Boiss. 6, App. 1: 12; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 283.

Описан из Парагвая.

ЗК; ЦК; СЗЗ; ЗЗ. Культивируется как декоративное растение, дичает.

Сев. (США, Мексика — натурализовался), Центр. (натурализовался), Южн. Америка (от Бразилии до Аргентины).

В культуре могут встретиться также близкий вид *C. spinosa* Jacq., имеющий более развитые парные колючки у основания листьев и менее крупные беловатые цветки, и *C. speciosa* Raf., характеризующийся более крупными размерами, отсутствием колючек и обычно розовыми цветками.

Fam. 70. **BRASSICACEAE** Burnett, nom. cons., nom. alt.

(**CRUCIFERAE** Juss., nom. cons.)*

Supertrib. 1. **BRASSICODAE** V. E. Avet.

Trib. 1. **Brassicaceae** DC.

Subtrib. 1. **Brassicinae** Sond.

1 (213). **Brassica** L.

Subgen. 1. **Melanosinapis** (DC.) V. I. Dorof.

1 (1140). **B. nigra** (L.) W. D. J. Koch, 1833, in Röhl. Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 713; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 168; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 50. — *Sinapis nigra* L. 1753, Sp. Pl.: 668.

Описан из Европы. Lectotypus (Jonsell, Jarvis, 2002: 71): Herb. Clifford: 338, «*Sinapis 2*» (BM!).

ЗК: Бело-Лаб.; **БК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЮЗ:** Занг.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1980: 38).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Африка; Сев., Южн. Америка (заносное); Австралия (юг — заносное).

Subgen. 2. **Rossosinapis** V. I. Dorof.

Sect. 1. **Junceae** (V. I. Dorof.) V. I. Dorof.

2 (1141). **B. juncea** (L.) Czern. 1859, Consp. Pl. Charcov.: 8; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 168; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 49. — *Sinapis juncea* L. 1753, Sp. Pl.: 668.

* В. И. Дорофеев (Дорофеев, 2003, 2004а, б).

Описан из Азии («in Asia»). *Lectotypus* (Bailey, 1922: 95): Herb. Linn. 845.11 (LINN!).

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЮЗ:** Ерев., Занг.; **Т:** Культивируется, иногда встречается как сорное.

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев., Центр. Америка (заносное); Австралия (заносное).

3 (1142). ***B. sisymbrioides*** (Fisch.) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 168; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 51. — *B. tournefortii* Gouan var. *sisymbrioides* Fisch. 1821, in DC. Syst. Nat. 2: 602. — *B. tournefortii* auct. non Gouan: Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 466.

Описан из Талыша. *Lectotypus* (Дорофеев, 2002: 43): «Lenkoran, Hansen. Herb. Fischer» (LE!); syntypus: «Persia bor., Hansen» (LE!).

ВК: Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т:**

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 208); **ВК:** Кубин. (Гроссгейм, 1950: 168).

Вост. Европа (Ижевск — заносное); Юго-Зап. (сев. Иран), ?Ср. Азия.

Sect. 2. *Campestres* V. I. Dorof.

4 (1143). ***B. campestris*** L. 1753, Sp. Pl.: 666; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 167; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 48. — *B. rapa* L. subsp. *campestris* (L.) A. R. Clapham, 1952, Fl. Brit. Isl.: 153.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Bailey, 1930: 247, fig. 128): Herb. Linn. 844.4 (LINN!).

Все районы Кавказа.

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Юго-Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

5 (1144). ***B. napus*** L. 1753, Sp. Pl.: 666; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 167; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 49. — *B. rapa* L. subsp. *napus* (L.) Schübl. et G. Martens, 1834, Fl. Württemberg: 438.

Описан из Атлантической Европы. *Lectotypus* (Jonsell, 1982: 7): Herb. Linn. 844.10 (LINN!).

ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. («Урочище Зеленая Роща, 30 IV 1992, А. Солодыко»), Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Севан.; **Т:**

Указан для **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Гроссгейм, 1950: 167); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Хинтибидзе, 1979: 165); **ЦЗ:** Лори; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Мегр.-Зан. (Аветисян, 1966: 287).

Евразия (умеренные широты); Сев. Африка; Сев., Южн. Америка; Австралия. Главным образом как культурное растение.

6 (1145). ***B. rapa*** L. 1753, Sp. Pl.: 666; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 167; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 50.

Описан из Атлантической Европы. *Lectotypus* (Oost et al., 1987: 626, fig. 2): [Icon] P. A. Matthioli, 1586, Pl. Erit.: 219, «*Rapum*».

Во всех районах Кавказа культивируется как пищевое (репа) и кормовое (турнепс) растение, иногда дичает.

В культуре почти повсеместно.

Subgen. 3. **Brassica**

7 (1146). **B. oleracea** L. 1753, Sp. Pl.: 667; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 166; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 50.

Описан из Англии («in maritimis Angliae»). *Neotypus* (Oost et al., 1989: 332, fig. 2): Herb. Sloane: 123: 4, «*Brassica maritima arborea seu procerior ramosa*», pl. dextra (BM-SL).

Во всех районах Кавказа культивируется в большом количестве сортов, иногда дичает.

Атл., Южн. Европа. В культуре почти повсеместно.

Экземпляров, сходных по морфологии с типовыми, не обнаружено. Дикорастущая капуста, вероятно, имеет приморский ареал, но на морских побережьях Кавказа не встречается.

2 (214). **Sinapis** L.

Subgen. 1. **Sinapis**

Sect. **Leucosinapis** DC.

1 (1147). **S. alba** L. 1753, Sp. Pl.: 668; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 169; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 111. — *Brassica alba* (L.) Boiss. 1839, Voy. Bot. Espagne, 2: 39.

Описан из Атлантической Европы. *Lectotypus* (Jafri, 1973: 29): Herb. Linn. 845.4 (LINN!).

ЗП; ВП: В. Ставро.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Асо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.

Европа; Средиз.; Сев. (заносное), Юго-Зап., Вост. (заносное) Азия; Сев. Африка; Сев., Центр. Америка (заносное); Австралия (юго-вост. — заносное).

2 (1148). **S. dissecta** Lag. 1816, Gen. Sp. Pl.: 20; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 113. — *Brassica dissecta* (Lag.) Boiss. 1839, Voy. Bot. Espagne, 2: 40. — *Sinapis alba* L. subsp. *dissecta* (Lag.) Simonk. 1886, Enum. Fl. Transsilv.: 88.

Описан из Испании («inter sata, praesertim Lini usitatissimi, circa Cuevas overa oppidum, Heliocratom, Murciam, Orcelem, ablique»).

ЗК: Уруп-Теб.

Атл., Центр. (юг), Южн., Вост. Европа; Средиз. (от Португалии до Албании, Марокко).