

Описан из окр. Нахичевани. Ту р u s: «Armenia, in ...salsi argillosis ad Nakizivan urbem, 20 VI [1]829, № 429, Szovits» (LE!).

**ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Нах.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

4 (1196). **S. odontogera** Bordz. 1935, Журн. Инст. бот. УАН, 3, 2: 71. — *S. odontophora* Bordz. 1938, Сборн. праць пам. акад. О. В. Фомина: 58; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 132.

Описан из Армении. Ту р u s: «Armenia, Daralagez (Wajotz-Dzor), prope pagum Ortakend, 23 VII 1933, A. Mowsessjan» (ERE).

**ЮЗ:** Дар.

Эндемик.

## 16 (228). **Clypeola** L.

1 (1197). **C. dichotoma** Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 175. — *Pseudoanastatica dichotoma* (Boiss.) Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 212; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 223.

Описан из Азербайджана («№ 4082, Aderbidjan»).

**ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран, Афганистан).

2 (1198). **C. elegans** Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 38.

Описан из Турции («in Armeniâ inter Zarbaz et Nahocl. Huet du Pavillon»).

**ЗЗ:** Адж.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция).

3 (1199). **C. jonthlasi** L. 1753, Sp. Pl.: 652; Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 144; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 365; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 222; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 62. — *C. microcarpa* Moris, 1841, Atti Riunione Sci. Ital. 3: 539; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 222. — *C. bruhnsii* Gruner, 1867, Bull. Soc. Nat. Moscou, 40, 4: 396.

Описан из Италии. Lectotypus (Ball, 1993: 35): Herb. Clifford: 329, «*Clypeola* 1» (BM!).

**ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Абх.; **ЮЗ:** Ерев., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1950: 222).

Южн., Юго-Вост. (Крым), Вост. (Тульская обл.) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Синайского п-ова до Пакистана), Ср. Азия; Сев. Африка.

## Subtrib. 2. **Raphaniinae** Hayek

### 17 (229). **Raphanus** L.

1 (1200). **R. maritimus** Sm. 1806, Engl. Bot. 23: tab. 1643; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 173; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 105. — *Raphanistrum*

*maritimum* (Sm.) Andrz. 1822, in Bess. Enum. Pl. Volhyn.: 70, 82. — *R. odessanum* Andrz. 1822, l. c.: 82. — *Raphanus odessanus* (Andrz.) Spreng. 1815, Syst. Veg. 2: 855. — *R. raphanistrum* L. subsp. *maritimus* (Sm.) Thell. 1918, in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4, 1: 278. — *R. raphanistrum* subsp. *odessanus* (Andrz.) Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 81.

Описан из Шотландии.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **СЗЗ;** **ЗЗ.**

Атл., Южн., Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев. Африка; Австралия (о. Тасмания: юго-вост. — заносное).

Существуют желтоцветковая и белоцветковая формы; первая встречается чаще.

2 (1201). **R. raphanistrum** L. 1753, Sp. Pl.: 669; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 173; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 105. — *R. candidus* Vorosch. 1947, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 52, 2: 48.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 2002: 71): Herb. Clifford: 340, «*Raphanus 2*» (BM!).

**ЦК:** В. Тер.; **БК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЗП;** **ВП** (Галушко, 1980: 39); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Гроссгейм, 1950: 173), Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1980: 39), В. Кум.; **БК:** Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1950: 173), В. Сулак.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Галушко, 1980: 39), Абх. (Гроссгейм, 1950: 173), Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Хинтибидзе, 1979: 182); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Ахундов, 1953: 226); **ЮЗ:** Ерев., Севан. (Аветисян, 1966: 301).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев., Центр. Америка (заносное); Австралия (заносное).

Существует, как и *R. maritimus*, в двух географически неизолированных формах — белоцветковой и желтоцветковой.

3 (1202). **R. rostratus** DC. 1821, Syst. Nat. 2: 666; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 173.

Описан из Талыша («in Persiâ boreali prope Lenkeran (Fisch.)»).

**Т.**

Юго-Зап. Азия (Иран, Афганистан, Пакистан).

4 (1203). **R. sativus** L. 1753, Sp. Pl.: 669; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 172; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 106. — *R. raphanistrum* L. var. *sativus* (L.) Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 81.

Описан по образцам неизвестного происхождения. *Lectotypus* (Jonsell, 1982: 8): Herb. Linn. 846.1 (LINN!).

Культивируется на Кавказе как пищевое растение, иногда дичает.

Естественно произрастает, вероятно, только в Юго-Восточной Азии и на западе Северной Америки. Повсюду культивируется, иногда дичает.