

18 (230). **Crambe** L.

Sect. 1. **Crambe**

Subsect. 1. **Crambe**

1 (1204). **C. maritima** L. 1753, Sp. Pl.: 671; Черняк. 1939, Фл. СССР, 8: 478; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 175; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 65. — *C. pontica* Steven ex Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 293 (Fl. Cauc.), nom. nud.

Описан из Атлантической Европы. *Lectotypus* (Khalilov, 1993: 114): Herb. Linn. 849.1 (LINN!).

ЗП: Аз.-Куб.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост. (Крым), Вост. (зап., юг) Европа; Юго-Зап. Азия (Израиль, Иордания); Сев. Африка.

2 (1205). **C. pinnatifida** W. T. Aiton, 1812, Hort. Kew. ed. 2, 4: 72; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 175; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 65. — *C. maritima* L. subsp. *pinnatifida* (W. T. Aiton) Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 83.

Описан из Европы («in Hungariae, Tauriae...»).

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр. (Гроссгейм, 1950: 175); **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 41); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Гроссгейм, 1950: 175). Центр. (юг), Южн., Юго-Вост. (Крым), Вост. (юг) Европа.

3 (1206). **C. cordifolia** Steven, 1812, Мém. Soc. Nat. Moscou, 3: 267; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 175; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 64.

Описан из окр. Георгиевска и Моздока. *Lectotypus* (Дорофеев, 2003: 64): «Georg[iewsk], Fischer» (LE!).

ВП: В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум., Малк.

Эндемик.

4 (1207). **C. gibberosa** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 136 (Fl. Cauc.); Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 175; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 64. — *C. tataria* Sebeók var. *buschii* O. E. Schulz, 1919, in Engl. Pflanzenr. 86, 4, 105: 234. — *C. buschii* (O. E. Schulz) Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 179.

Описан с Восточного Кавказа. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In monte Beschbarmak, 21 VII 1830» (LE!).

ЦК: Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак. (Гроссгейм, 1950: 175); **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 41).

Эндемик.

Subsect. 2. **Tatariae** I. I. Khalilov

5 (1208). **C. grandiflora** DC. 1821, Syst. Nat. 2: 652; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 176; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 65.

Описан из Западного Предкавказья. *Lectotypus* (Дорофеев, 2003: 65): «*Taman [Steven]*» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ЦК:** Малк.; **БК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1980: 41), Тер.-Кум. (Гроссгейм, 1950: 176); **ЦК:** В. Тер.; **БК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 41); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Гроссгейм, 1950: 176).

Юго-Вост. Европа (Крым).

6 (1209). **C. tataria** Sebeók, 1779, Diss. Tatar. Hung.: 7; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 175; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 66.

Описан из Венгрии.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **БК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Кум., Малк. (Гроссгейм, 1950: 175), В. Тер.; **БК:** Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Галушко, 1980: 41).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция) Азия.

7 (1210). **C. steveniana** Rupr. 1869, *Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.)*, sér. 7, 15, 2: 136 (Fl. Cauc.); Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 176; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 66. — *C. steveniana* f. *охусарпа* Rupr. 1869, l. c.: 136. — *C. pinnatifida* auct. non DC.: Steven, 1856, *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 19: 290.

Описан из Восточного Предкавказья. *Lectotypus* (Льїнська, 2002: 15): «*Ciscaucasus, pr. Georgieffsk, lecto a D. Héfft!*» (LE!).

ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк.; **?ВЗ:** Караб.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Гроссгейм, 1950: 176); **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1980: 41).

Юго-Вост. Европа (Крым).

Sect. 2. **Oriente crambe** I. I. Khalilov

8 (1211). **C. orientalis** L. 1753, *Sp. Pl.*: 671; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 177.

Описан из Азии. *Lectotypus* (Khalilov, 1993: 112): *Herb. Linn.* 849.3 (LINN).

ВЗ: Ширв.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг.

Указан для **Т** (Гроссгейм, 1950: 177, карта 205).

Вост. Европа (Московская обл., Чувашия — заносное); Юго-Зап. Азия (от Турции и Израиля до Ирана).

9 (1212). **C. koktebelica** (Junge) N. Busch, 1908, *Mat. фл. Кавк.* 3, 4: 296; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 176; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 65. — *C. juncea* Vieb. var. *koktebelica* Junge, 1904, *Тр. Петерб. общ. естествоисп.* 35, 1: 395.

Описан из Крыма. *Lectotypus* (Льїнська, 2002: 14): «*Коктебель, 18 VI (01 VII) 1904*» (LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Указан для **ЗП**: Аз.-Куб. (Иванов, 2001: 65); **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1980: 41); **ЦК**: В. Кум. (Иванов, 2001: 65).

Юго-Вост. (Крым), Вост. (юг России) Европа.

10 (1213). **C. armena** N. Busch, 1927, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 3–4: 7; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 176.

Описан из Нахичевани. Ту р u s: «Flora Armeniaca, Nachitschevan, prope Salinas, 12 V 1923, A. Grossheim» (LE!).

ВЗ: Ширв.; **ЮЗ**: Ерев., Нах.

Эндемик.

11 (1214). **C. grossheimii** I. I. Khalilov, 1990, Бот. журн. 75, 11: 1572.

Описан из Нахичевани. Ту р u s: «Нахичеванская АССР, близ соляных промыслов, № 17, 22 VI 1987, И. И. Халилов» (LE!).

ЮЗ: Нах.

Эндемик.

12 (1215). **C. juncea** Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 421; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 176. — *C. orientalis* L. var. *juncea* O. E. Schulz, 1919, in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 70: 238. — *C. juncea* var. *aculeolata* N. Busch, 1908, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 299. — *C. orientalis* var. *juncea* f. *aculeolata* (N. Busch) O. E. Schulz, 1919, l. c.: 238. — *C. aculeolata* (N. Busch) Czerniak. 1939, Фл. СССР, 8: 651; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 177.

Описан из Грузии («in Iberià»). L e c t o t y p u s (Dorofeyev, hoc loco): «Tiflis, MB suppl.» (LE!).

ЦЗ; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т**.

Юго-Зап. Азия (Иран).

19 (231). **Cakile** Mill.

1 (1216). **C. euxina** Pobed. 1953, Бот. мат. (Ленинград), 15: 71; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 178; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 51. — *C. maritima* Scop. subsp. *euxina* (Pobed.) Nyár. 1955, in Săvul. Fl. Republ. Social. România, 3: 480. — *C. maritima* auct. non Scop.: Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 473.

Описан с черноморского побережья Украины. Ту р u s: «Растения Украины, северное Черноморское побережье, г. Скадовск, на берегу моря в черте города, 15 VIII 1947, № 48, Е. Победимова» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**: Тер.-Сулак.; **ВК**: Ман.-Самур.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ВЗ**: Ширв., ?Н. Кур.; ?**Т**.

Указан для **ВК**: Кубин. (Галушко, 1980: 42); **СЗЗ**: Пшад.-Джубг.; **ЗЗ**: Инг.-Рион., Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 178).

Юго-Вост. (Румыния, Болгария, Турция, Крым), Вост. (Причерноморье) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).