

Описан из Атлантической Европы. *Lectotypus* (Oost et al., 1987: 626, fig. 2): [Icon] P. A. Matthioli, 1586, Pl. Erit.: 219, «*Rapum*».

Во всех районах Кавказа культивируется как пищевое (репа) и кормовое (турнепс) растение, иногда дичает.

В культуре почти повсеместно.

### Subgen. 3. **Brassica**

7 (1146). **B. oleracea** L. 1753, Sp. Pl.: 667; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 166; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 50.

Описан из Англии («in maritimis Angliae»). *Neotypus* (Oost et al., 1989: 332, fig. 2): Herb. Sloane: 123: 4, «*Brassica maritima arborea seu procerior ramosa*», pl. dextra (BM-SL).

Во всех районах Кавказа культивируется в большом количестве сортов, иногда дичает.

Атл., Южн. Европа. В культуре почти повсеместно.

Экземпляров, сходных по морфологии с типовыми, не обнаружено. Дикорастущая капуста, вероятно, имеет приморский ареал, но на морских побережьях Кавказа не встречается.

### 2 (214). **Sinapis** L.

#### Subgen. 1. **Sinapis**

#### Sect. **Leucosinapis** DC.

1 (1147). **S. alba** L. 1753, Sp. Pl.: 668; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 169; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 111. — *Brassica alba* (L.) Boiss. 1839, Voy. Bot. Espagne, 2: 39.

Описан из Атлантической Европы. *Lectotypus* (Jafri, 1973: 29): Herb. Linn. 845.4 (LINN!).

**ЗП; ВП:** В. Ставро.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Асо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.

Европа; Средиз.; Сев. (заносное), Юго-Зап., Вост. (заносное) Азия; Сев. Африка; Сев., Центр. Америка (заносное); Австралия (юго-вост. — заносное).

2 (1148). **S. dissecta** Lag. 1816, Gen. Sp. Pl.: 20; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 113. — *Brassica dissecta* (Lag.) Boiss. 1839, Voy. Bot. Espagne, 2: 40. — *Sinapis alba* L. subsp. *dissecta* (Lag.) Simonk. 1886, Enum. Fl. Transsilv.: 88.

Описан из Испании («inter sata, praesertim Lini usitatissimi, circa Cuevas overa oppidum, Heliocratom, Murciam, Orcelem, ablique»).

**ЗК:** Уруп-Теб.

Атл., Центр. (юг), Южн., Вост. Европа; Средиз. (от Португалии до Албании, Марокко).

Subgen. 2. **Ceratosinapis** (DC.) V. I. Dorof. comb. nova.

— *Sinapis* sect. *Ceratosinapis* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 607, 611.

Typus: *S. arvensis* L.

3 (1149). **S. arvensis** L. 1753, Sp. Pl.: 668; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 169; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 112. — *Brassica sinapistrum* Boiss. 1839, Voy. Bot. Espagne, 2: 39. — *B. sinapistrum* f. *brachycarpa* N. Busch, 1910, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 281.

Описан из Европы. Lectotypus (Jafri, 1973: 29): Herb. Linn. 845.2 (LINN!).

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев., Центр. Америка (заносное); Австралия (юго-вост. и зап. — заносное).

Для Кавказа приводится опушенноплодная разновидность данного вида — [var.] *β. orientalis* (L.) C. Koch. 1841, Linnaea, 15: 252.

### 3 (215). **Erucastrum** C. Presl

1 (1150). **E. armoracioides** (Czern. ex Turcz.) Cruchet, 1902, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat.: 333; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 77. — *Brassica armoracioides* Czern. ex Turcz. 1854, Bull. Soc. Nat. Moscou, 27, 2: 311. — *B. elongata* Ehrh. subsp. *armoracioides* (Czern. ex Turcz.) Asch. et Graebn. 1898, Fl. Nordostdeut. Flachl.: 360. — *B. elongata* subsp. *integrifolia* (Boiss.) Breistr. 1944, Bull. Soc. Sci. Dauphiné, 60: 139. — *B. elongata* auct. non Ehrh.: Синская, 1939, Фл. СССР, 8: 464; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 167.

Описан из Украины. Lectotypus (Ільїнська, 2002: 12): «Ucraniae, in camp-estribus, Julio, Czern.» (LE!).

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Америка (США — заносное); Австралия (заносное).

2 (1151). **E. cretaceum** Kotov, 1939, Журн. Инст. бот. УАН, 21–22: 237; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 77. — *Brassica elongata* Ehrh. var. *pinnatifida* Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 80, descr. ross. — *B. elongata* subsp. *pinnatifida* (Schmalh.) Greuter et Burdet, 1985, Willdenowia, 15, 1: 64.

Описан из Украины. Typus: «Укр. SSR, prov. Voroschilovgrad, distr. Lisiczansk, in cretaceis prope pagum Vjelogorovka, 11 IX 1936, M. Kotov» (CWU).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Центр. (Венгрия), Вост. (юг) Европа; Сев. Америка (Канада — заносное).

3 (1152). **E. takhtajanii** V. I. Dorof. 2000, Бот. журн. 85, 7: 183.

Описан из Армении. Typus: «Armjanskaja RSS, distr. Artashat, in adjacentibus pagi Juva, decliva sicca, 25 VIII 1966, A. Takhtajan, T. Popova» (LE!).