

Subtrib. 3. **Buniadinae** Wettst.

20 (232). **Bunias** L.

1 (1217). **B. orientalis** L. 1753, Sp. Pl.: 670; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 227; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 51.

Описан из России. *Le cotto ty rus* (Jonsell, Jarvis, 2002: 68): Herb. Linn. 847.4 (LINN!).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Адаг.-Пишиш.; **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Гроссгейм, 1950: 227), Пшад.-Джубг. (Галушко, 1980: 42); **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 227); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Мегр.-Зан. (Аветисян, 1966: 104).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Юго-Вост. Азия; Сев. Америка (Канада, США — заносное).

21 (233). **Calepina** Adans.

1 (1218). **C. irregularis** (Asso) Thell. 1905, in Schinz u. R. Keller, Fl. Schweiz. ed. 2, 1: 218; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 173; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 52. — *Myagrum irregulare* Asso, 1779, Syn. Stirp. Aragon.: 82. — *Calepina corvini* Desv. 1814, Journ. Bot. Appl. (Paris), 3: 158.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гроссгейм, 1950: 173); **ЦЗ:** Лори; **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Аветисян, 1966: 299).

Атл., Центр. (юг), Южн., Юго-Вост., Вост. (юг, юго-вост.) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Ирана), Ср. (Туркменистан) Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (вост. США — заносное).

22 (234). **Neslia** Desv., nom. cons.

1 (1219). **N. apiculata** Fisch., C. A. Mey. et Avé-Lall. 1842, Delect. Sem. Hort. Bot. Petropol. (1841), 8: 68; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 226; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 103. — *N. thracica* Velen. 1891, Österr. Bot. Zeitschr. 41: 122. — *N. paniculata* (L.) Desv. subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. 1894, Österr. Bot. Zeitschr. 44: 125.

Описан с Синайского п-ова. *Ty rus*: «Ad radices montis Sinai, locis graminosis, 6 V 1835, W. Schimper» (LE!).