

*caria gnaphalodes* (DC.) Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 161. — *Physoptychis gnaphalodes* (DC.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 260; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 210.

Описан из северного Ирана («...in der persischen Landschaft Gilan»). Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «Herb. Pall[as]. Persia, Gilan, in cacumine alpium Samamistic., m. julii floret.» (LE!).

**ЮЗ:** Занг.

Юго-Зап. Азия (Ирак, Иран).

## 25 (237). *Coluteocarpus* Boiss.

1 (1223). *C. vesicaria* (L.) Holmboe, 1907, Bergens Mus. Årbog (Årbok), 13: 6; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 132. — *Alyssum vesicaria* L. 1753, Sp. Pl.: 651. — *Vesicaria reticulata* Lam. ex Poir. 1808, in Lam. Encycl. Méth. Bot. 8: 572. — *Coluteocarpus reticulatus* (Lam. ex Poir.) Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 162.

Описан из Юго-Западной Азии («in Oriente»). Lectotypus (Al-Shehbaz, Turland in Cafferty, Jarvis, 2002: 531): [Icon] J. P. Tournefort, 1717, Rel. Voy. Levant, 2: 252, «*Vesicaria Orientalis foliis dentatis*».

**ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг.

Указан для **ЦК:** В. Тер.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос. (Гроссгейм, 1950: 132).

Юго-Зап. Азия (Турция, Ливан, сев. Ирак, зап. Иран).

## Supertrib. 2. SISYMBRIODAE V. E. Avet.

### Trib. 1. *Thelypodieae* Prantl

#### Subtrib. *Lunariinae* Wettst. ex Hayek

## 26 (238). *Lunaria* L.

1 (1224). *L. annua* L. 1753, Sp. Pl.: 653; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 150; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 98.

Описан из Центральной Европы. Lectotypus (Ball, 1993: 62): Herb. Linn. 832.2 (LINN!).

Изредка культивируется как декоративное растение, иногда дичает.

Атл. (Ирландия), Сев. (Норвегия, Швеция), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (Италия, Греция); Сев., Юго-Зап. Азия; Сев. Африка (Макаронезия); Сев., Южн. (Аргентина) Америка; Австралия (Новая Зеландия). Родина, вероятно, Апеннинский и Балканский п-ова; в остальных указанных регионах как натурализовавшееся из культуры.