

Trib. 2. **Hesperideae** Prantl

Subtrib. 1. **Matthiolinae** Janch.

27 (239). **Matthiola** W. T. Aiton, nom. cons.

1 (1225). **M. incana** (L.) W. T. Aiton, 1812, Hort. Kew. ed. 2, 4: 120; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 250; В. И. Дороф. 2002, Turczaninowia, 5, 3: 91. — *Cheiranthus incanus* L. 1753, Sp. Pl.: 662.

Описан из Испании. *Lectotypus* (Jafri, 1973: 200): Herb. Linn. 839.17 (LINN).

На Кавказе только в культуре, иногда дичает.

Атл., Южн., Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев., Южн. Африка; Сев. (США: Техас, Калифорния; Мексика), Южн. (Эквадор, Перу, Чили) Америка; Австралия (зап., юг; Новая Зеландия). Родина, вероятно, европейское Средиземноморье; в остальных указанных регионах как натурализованное из культуры. Широко культивируется.

2 (1226). **M. boissieri** Grossh. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 13: 14.

Описан из северного Ирана и Южного Закавказья. *Typus*: «Prov. Aderbeidzan, distr. Khoi, in colle salem continente ad pag. Shabanli, 3 V [1]828, Szovits» (LE!).

ВЗ: Ширв.; **ЮЗ:** Нах.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

3 (1227). **M. caspica** (N. Busch) Grossh. 1948, Опр. раст. Кавк.: 403; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 248; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 98. — *M. odoratissima* (Pall. ex Bieb.) W. T. Aiton var. *caspica* N. Busch, 1910, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 675.

Описан с Восточного Кавказа. *Lectotypus* (Дорофеев, 2003: 99): «Дагестан, Чир-юрт, 11 V 1891, В. Липский» (LE!).

ЦК: В. Тер.; **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак.; **БК:** Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв. (Гроссгейм, 1950: 248).

Эндемик.

4 (1228). **M. daghestanica** (Conti) N. Busch, 1910, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 676; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 248; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 99. — *M. fragrans* Bunge subsp. *daghestanica* Conti, 1900, Mém. Herb. Boiss. 18: 45.

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Дорофеев, 2003: 99): «Daghestania australis, prope Achty, 1874, № 22, A. Becker» (LE!); *syntypi*: «Daghestan, Achty, 1880, № 206, Becker; Caucasus, Achty, № 358, Becker» (LE!).

ЦК: В. Тер.; **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.

Эндемик.

5 (1229). **M. odoratissima** (Pall. ex Bieb.) W. T. Aiton, 1812, Hort. Kew. ed. 2, 4: 120; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 248; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 99. — *Cheiranthus odoratissimus* Pall. ex Bieb. 1800, Beschr. Länd. Terek Casp.: 183.

Описан из Крыма и с Кавказа. *Lectotypus* (Fedoronchuk in Ильїнська, 2002: 14): «In confragosis maritimis Tauriae, praet. circa Sudagh a mont.» (LE!).

ВП: Аз.-Куб.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1980: 63), В. Тер.; **ВЗ:** Алаз.-Агрин.; **ЮЗ:** Дар.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 248).

Юго-Вост. Европа (?Болгария, Крым); Юго-Зап. Азия (Иран).

6 (1230). **M. robusta** Bunge, 1847, Arbeiten Naturf. Vereins Riga, 1: 137; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 250.

Описан с Кавказа («Am Vorgebirge Airakli an der Ostküste des kaspischen Meeres 11 V (florens), 28 V (fructificans), bei Nowo-Alexandrowsk 19 V 1840»).

Т («Lenkoran»).

Указан для **ВЗ:** Н. Кур. (Bunge, 1847: 137).

Ср. Азия.

В Гербарии LE имеется только процитированный выше образец из Талыша. А. А. Гроссгейм (1950) считает, что этикетка этого образца ошибочна.

7 (1231). **M. tatarica** (Pall.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 170; В. И. Дориф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 99. — *Hesperis tatarica* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 497. — *Matthiola odoratissima* Bunge b. *tatarica* (Pall.) Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 59. — *M. odoratissima* subsp. *taurica* (Pall.) Stankov, 1947, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 1: 315. — *M. caspica* (N. Busch) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 248.

Описан из Казахстана. *Isolectotypus*: «Ad loc. Indericus» (MW — Herb. Trin. (№ 416)).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Тамань); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 63); **СЗЗ:** Пшад.-Джубг. (Гроссгейм, 1950: 248).

Вост. Европа (юг, юго-вост.); Сев. (Зап. Сибирь), Ср. Азия.

8 (1232). **M. taurica** (Conti) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 250. — *M. odoratissima* Bunge var. *taurica* Conti, 1900, Mém. Herb. Boiss. 18: 49. — *M. odoratissima* var. *integrifolia* Conti, 1900, l. c.: 48.

Описан из Крыма («Crimée»).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Юго-Вост. Европа (Крым).

28 (240). **Sperihedium** V. I. Dorof.

1 (1233). **S. triste** (L.) V. I. Dorof. 2012, Консп. фл. Вост. Евр. 1: 379. — *Hesperis tristis* L. 1753, Sp. Pl.: 663; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 233. — *Hesperidium triste* (L.) Beck ex V. I. Dorof. 2002, Turczaninowia, 5, 3: 78, comb. inval.; Beck, 1892, Fl. Nieder-Österreich, 2, 1: 474, in syn.