

Описан из Крыма и с Кавказа. Lectotypus (Fedoronchuk in Ильїнська, 2002: 14): «In confragosis maritimis Tauriae, praet. circa Sudagh a mont.» (LE!).

ВП: Аз.-Куб.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1980: 63), В. Тер.; **ВЗ:** Алаз.-Агрин.; **ЮЗ:** Дар.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 248).

Юго-Вост. Европа (?Болгария, Крым); Юго-Зап. Азия (Иран).

6 (1230). **M. robusta** Bunge, 1847, Arbeiten Naturf. Vereins Riga, 1: 137; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 250.

Описан с Кавказа («Am Vorgebirge Airakli an der Ostküste des kaspischen Meeres 11 V (florens), 28 V (fructificans), bei Nowo-Alexandrowsk 19 V 1840»).

Т («Lenkoran»).

Указан для **ВЗ:** Н. Кур. (Bunge, 1847: 137).

Ср. Азия.

В Гербарии LE имеется только процитированный выше образец из Талыша. А. А. Гроссгейм (1950) считает, что этикетка этого образца ошибочна.

7 (1231). **M. tatarica** (Pall.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 170; В. И. Дориф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 99. — *Hesperis tatarica* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 497. — *Matthiola odoratissima* Bunge b. *tatarica* (Pall.) Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 59. — *M. odoratissima* subsp. *taurica* (Pall.) Stankov, 1947, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 1: 315. — *M. caspica* (N. Busch) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 248.

Описан из Казахстана. Isolectotypus: «Ad loc. Indericus» (MW — Herb. Trin. (№ 416)).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Тамань); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 63); **СЗЗ:** Пшад.-Джубг. (Гроссгейм, 1950: 248).

Вост. Европа (юг, юго-вост.); Сев. (Зап. Сибирь), Ср. Азия.

8 (1232). **M. taurica** (Conti) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 250. — *M. odoratissima* Bunge var. *taurica* Conti, 1900, Mém. Herb. Boiss. 18: 49. — *M. odoratissima* var. *integrifolia* Conti, 1900, l. c.: 48.

Описан из Крыма («Crimée»).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Юго-Вост. Европа (Крым).

28 (240). **Sperihedium** V. I. Dorof.

1 (1233). **S. triste** (L.) V. I. Dorof. 2012, Консп. фл. Вост. Евр. 1: 379. — *Hesperis tristis* L. 1753, Sp. Pl.: 663; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 233. — *Hesperidium triste* (L.) Beck ex V. I. Dorof. 2002, Turczaninowia, 5, 3: 78, comb. inval.; Beck, 1892, Fl. Nieder-Österreich, 2, 1: 474, in syn.

Описан из Венгрии. *Lectotypus* (Ball, 2002: 533): Herb. Linn. 841.1 (LINN!).
ЗП; ВП: В. Ставр.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Ширв.
Указан для **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1950: 233).
Центр. (юг), Южн., Юго-Вост. (вост.), Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция), Ср.
Азия.

29 (241). *Anchonium* DC.

1 (1234). *A. elichrysifolium* (DC.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 240; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 234. — *Sterigma elichrysifolia* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 581.

Описан из Армении и Ирана («Hab. in Armeniâ (Tourn), in Persae provinciâ Gilanensi (Gmel.)»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Gilan» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Севан., Занг.

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Ирак, Иран).

2 (1235). *A. persicum* (DC.) Bornm. 1904, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 4: 1265. — *Matthiola persica* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 168. — *Anchonium elichrysifolium* (DC.) Boiss. var. *persicum* (DC.) Bornm. 1936, Feddes Repert. (Beih.), 89, 1: 39. — *A. elichrysifolium* subsp. *persicum* (DC.) Cullen et Coode, 1965, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 26: 193.

Описан из Ирана («in Persiâ»).

ВЗ: Мург.-Муровд. (Памбакский хр., гора Кер-оглы); **ЮЗ:** Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Иран).

30 (242). *Sterigmostemum* Bieb.

1 (1236). *S. acanthocarpum* (Fisch. et C. A. Mey.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 1: 36; Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 220, comb. superfl. — *Sterigma acanthocarpum* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 38.

Описан из Нахичевани («in locis salsis Armeniae prope Nakitschivan»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In salsis lapidosis ad urbem Nakizivan, 16 VI [1]829 [Szovits]» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев. Иран).

2 (1237). *S. incanum* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 444; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 117. — *Cheiranthus torulosus* Bieb. 1808, l. c. 2: 121, non Thunb. 1800. — *Sterigmostemum torulosum* (Bieb.) Stapf, 1885, Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 50: 301; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 234.

Описан с Кавказа («in Iberia. D. Steven»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Iberia, Steven» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Ю. Караб.

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 234).