

Subgen. 2. **Ceratosinapis** (DC.) V. I. Dorof. comb. nova.

— *Sinapis* sect. *Ceratosinapis* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 607, 611.

Typus: *S. arvensis* L.

3 (1149). **S. arvensis** L. 1753, Sp. Pl.: 668; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 169; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 112. — *Brassica sinapistrum* Boiss. 1839, Voy. Bot. Espagne, 2: 39. — *B. sinapistrum* f. *brachycarpa* N. Busch, 1910, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 281.

Описан из Европы. Lectotypus (Jafri, 1973: 29): Herb. Linn. 845.2 (LINN!).

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ: Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев., Центр. Америка (заносное); Австралия (юго-вост. и зап. — заносное).

Для Кавказа приводится опушенноплодная разновидность данного вида — [var.] *β. orientalis* (L.) C. Koch. 1841, Linnaea, 15: 252.

3 (215). **Erucastrum** C. Presl

1 (1150). **E. armoracioides** (Czern. ex Turcz.) Cruchet, 1902, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat.: 333; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 77. — *Brassica armoracioides* Czern. ex Turcz. 1854, Bull. Soc. Nat. Moscou, 27, 2: 311. — *B. elongata* Ehrh. subsp. *armoracioides* (Czern. ex Turcz.) Asch. et Graebn. 1898, Fl. Nordostdeut. Flachl.: 360. — *B. elongata* subsp. *integrifolia* (Boiss.) Breistr. 1944, Bull. Soc. Sci. Dauphiné, 60: 139. — *B. elongata* auct. non Ehrh.: Синская, 1939, Фл. СССР, 8: 464; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 167.

Описан из Украины. Lectotypus (Ільїнська, 2002: 12): «Ucraniae, in camp-estribus, Julio, Czern.» (LE!).

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Америка (США — заносное); Австралия (заносное).

2 (1151). **E. cretaceum** Kotov, 1939, Журн. Инст. бот. УАН, 21–22: 237; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 77. — *Brassica elongata* Ehrh. var. *pinnatifida* Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 80, descr. ross. — *B. elongata* subsp. *pinnatifida* (Schmalh.) Greuter et Burdet, 1985, Willdenowia, 15, 1: 64.

Описан из Украины. Typus: «Укр. SSR, prov. Voroschilovgrad, distr. Lisiczansk, in cretaceis prope pagum Vjelogorovka, 11 IX 1936, M. Kotov» (CWU).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. Центр. (Венгрия), Вост. (юг) Европа; Сев. Америка (Канада — заносное).

3 (1152). **E. takhtajanii** V. I. Dorof. 2000, Бот. журн. 85, 7: 183.

Описан из Армении. Typus: «Armjanskaja RSS, distr. Artashat, in adjacentibus pagi Juva, decliva sicca, 25 VIII 1966, A. Takhtajan, T. Popova» (LE!).

ЮЗ: Ерев.
Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

4 (216). **Eruca** Mill.

1 (1153). **E. sativa** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 1; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 172; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 76. — *Brassica eruca* L. 1753, Sp. Pl.: 667. — *Eruca vesicaria* (L.) Cav. subsp. *sativa* (Mill.) Thell. 1918, in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4, 1: 201.

Описан из Швейцарии («in Helvetia»).

БК: В. Сулак., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах.

Указан для **БК:** Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гроссгейм, 1950: 172), Лори (Аветисян, 1966: 292); **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1950: 172), Занг, Мегр.-Зан. (Аветисян, 1966: 292); **Т** (Гроссгейм, 1950: 172).

Сев., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

Subtrib. 2. **Rapistrinae** Wettst.

5 (217). **Hirschfeldia** Moench

1 (1154). **H. incana** (L.) Lagr.-Foss. 1847, Fl. Tarn Garonne: 19; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 170; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 89. — *Sinapis incana* L. 1755, Cent. Pl. 1: 19. — *Hirschfeldia adpressa* Moench, 1794, Methodus: 264. — *Sinapis taurica* Vieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 450. — *Erucastrum incanum* (L.) W. D. J. Koch, 1837, Syn. Fl. Germ. Helv. 1: 56. — *Brassica incana* auct. non Ten.: Шмальг. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 79.

Описан из Европы («in Gallia, Lusitania, Hispania»). *Lectotypus* (Gómez-Campo, 2002: 535): [Icon] P. Hermann, 1698, Parad. Bat.: 155, «*Erysimum brevissimis siliquis subincanum*».

ЦК: В. Кум.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Занг, Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. (юг, Крым), Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Ирак, Иран), Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (США — заносное); Австралия (юго-вост. — заносное).

6 (218). **Rapistrum** Crantz, nom. cons.

1 (1155). **R. perenne** (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 1: 258; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 106. — *Myagrum perenne* L. 1753, Sp. Pl.: 640.

Описан из Франции. *Lectotypus* (Hedge, 2002: 535): Herb. Linn. 819.1 (LINN!).

В Гербарии LE имеется образец с этикеткой: «Balta, № 1421». Населенные пункты с названием Балта известны в Северной (**ЦК:** В. Тер.) и Южной (**ЦЗ:**