

Описан из Венгрии. *Lectotypus* (Ball, 2002: 533): Herb. Linn. 841.1 (LINN!).
ЗП; ВП: В. Ставр.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Ширв.
Указан для **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1950: 233).
Центр. (юг), Южн., Юго-Вост. (вост.), Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция), Ср.
Азия.

29 (241). *Anchonium* DC.

1 (1234). *A. elichrysifolium* (DC.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 240; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 234. — *Sterigma elichrysifolia* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 581.

Описан из Армении и Ирана («Hab. in Armeniâ (Tourn), in Persae provinciâ Gilanensi (Gmel.)»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Gilan» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Севан., Занг.

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Ирак, Иран).

2 (1235). *A. persicum* (DC.) Bornm. 1904, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 4: 1265. — *Matthiola persica* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 168. — *Anchonium elichrysifolium* (DC.) Boiss. var. *persicum* (DC.) Bornm. 1936, Feddes Repert. (Beih.), 89, 1: 39. — *A. elichrysifolium* subsp. *persicum* (DC.) Cullen et Coode, 1965, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 26: 193.

Описан из Ирана («in Persiâ»).

ВЗ: Мург.-Муровд. (Памбакский хр., гора Кер-оглы); **ЮЗ:** Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Иран).

30 (242). *Sterigmotemum* Bieb.

1 (1236). *S. acanthocarpum* (Fisch. et C. A. Mey.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 1: 36; Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 220, comb. superfl. — *Sterigma acanthocarpum* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 38.

Описан из Нахичевани («in locis salsis Armeniae prope Nakitschivan»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In salsis lapidosis ad urbem Nakizivan, 16 VI [1]829 [Szovits]» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев. Иран).

2 (1237). *S. incanum* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 444; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 117. — *Cheiranthus torulosus* Bieb. 1808, l. c. 2: 121, non Thunb. 1800. — *Sterigmotemum torulosum* (Bieb.) Stapf, 1885, Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 50: 301; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 234.

Описан с Кавказа («in Iberia. D. Steven»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Iberia, Steven» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Ю. Караб.

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 234).

Вост. Европа (Нижняя Волга); Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

3 (1238). **S. tomentosum** (Willd.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 444; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 234; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 117. — *Cheiranthus tomentosus* Willd. 1800, Sp. Pl. 3, 1: 523. — *Sterigma tomentosum* (Willd.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 579.

Описан из низовой Волги.

ВК: Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 233).

Вост. Европа (юго-вост.); Сев. (Зап. Сибирь), Юго-Зап. (сев.-вост. Турция, ?сев.-зап. Иран), Ср. (Казахстан) Азия.

31 (243). **Strigosella** Boiss.

Sect. 1. **Schirjajevija** (F. Dvořák) Botsch.

1 (1239). **S. africana** (L.) Botsch. 1972, Бот. журн. 57, 9: 1038; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 118. — *Hesperis africana* L. 1753, Sp. Pl.: 663. — *Malcolmia africana* (L.) W. T. Aiton, 1812, Hort. Kew. ed. 2, 4: 121; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 228. — *Cheiranthus taraxacifolius* Balb. 1814, Cat. Pl. Horti Taurin. App. 1: 10, non Stephan ex Willd. 1800. — *Malcolmia taraxacifolia* (Balb.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 439. — *Fedtschenkoa africana* (L.) F. Dvořák, 1970, Feddes Repert. 81, 6–7: 401. — *F. taraxacifolia* (Balb.) F. Dvořák, 1970, l. c.: 403.

Описан из Африки. Lectotypus (Ball, 2002: 533): Herb. Clifford: 335, «*Hesperis 3*» (BM!).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум. (Галушко, 1980: 58); **ВК:** Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (Гроссгейм, 1950: 228).

Центр., Южн., Юго-Вост. (юг, Крым), Вост. Европа; Средиз.; Сев. (Зап. Сибирь), Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Пакистана), Ср., Центр. (Китай, Монголия) Азия; Африка.

2 (1240). **S. laxa** (Lam.) Galushko, 1980, Фл. Сев. Кавк. 2: 58; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 118. — *Hesperis laxa* Lam. 1789, Encycl. Méth. Bot. 3, 1: 325. — *Malcolmia laxa* (Lam.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 440; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 228. — *M. africana* (L.) W. T. Aiton γ. *laxa* (Lam.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 223. — *Wilckia africana* (L.) F. Muell. var. *laxa* (Lam.) Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 115. — *Strigosella africana* (Lam.) Botsch. var. *laxa* (Lam.) Botsch. 1972, Бот. журн. 57, 9: 1038.

Описан с Нижней Волги.

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.

Вост. Европа (центр, юго-вост.).