

Вост. Европа (Нижняя Волга); Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

3 (1238). **S. tomentosum** (Willd.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 444; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 234; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 117. — *Cheiranthus tomentosus* Willd. 1800, Sp. Pl. 3, 1: 523. — *Sterigma tomentosum* (Willd.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 579.

Описан из низовой Волги.

БК: Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 233).

Вост. Европа (юго-вост.); Сев. (Зап. Сибирь), Юго-Зап. (сев.-вост. Турция, ?сев.-зап. Иран), Ср. (Казахстан) Азия.

31 (243). **Strigosella** Boiss.

Sect. 1. **Schirjajevija** (F. Dvořák) Botsch.

1 (1239). **S. africana** (L.) Botsch. 1972, Бот. журн. 57, 9: 1038; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 118. — *Hesperis africana* L. 1753, Sp. Pl.: 663. — *Malcolmia africana* (L.) W. T. Aiton, 1812, Hort. Kew. ed. 2, 4: 121; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 228. — *Cheiranthus taraxacifolius* Balb. 1814, Cat. Pl. Horti Taurin. App. 1: 10, non Stephan ex Willd. 1800. — *Malcolmia taraxacifolia* (Balb.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 439. — *Fedtschenkoa africana* (L.) F. Dvořák, 1970, Feddes Repert. 81, 6–7: 401. — *F. taraxacifolia* (Balb.) F. Dvořák, 1970, l. c.: 403.

Описан из Африки. Lectotypus (Ball, 2002: 533): Herb. Clifford: 335, «*Hesperis 3*» (BM!).

БК: В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум. (Галушко, 1980: 58); **БК:** Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (Гроссгейм, 1950: 228).

Центр., Южн., Юго-Вост. (юг, Крым), Вост. Европа; Средиз.; Сев. (Зап. Сибирь), Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Пакистана), Ср., Центр. (Китай, Монголия) Азия; Африка.

2 (1240). **S. laxa** (Lam.) Galushko, 1980, Фл. Сев. Кавк. 2: 58; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 118. — *Hesperis laxa* Lam. 1789, Encycl. Méth. Bot. 3, 1: 325. — *Malcolmia laxa* (Lam.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 440; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 228. — *M. africana* (L.) W. T. Aiton γ. *laxa* (Lam.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 223. — *Wilckia africana* (L.) F. Muell. var. *laxa* (Lam.) Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 115. — *Strigosella africana* (Lam.) Botsch. var. *laxa* (Lam.) Botsch. 1972, Бот. журн. 57, 9: 1038.

Описан с Нижней Волги.

БК: В. Сулак., Ман.-Самур.

Вост. Европа (центр, юго-вост.).

Sect. 2. **Fedtschenkoa** (Regel) Botsch.

3 (1241). **S. intermedia** (C. A. Mey.) Botsch. 1972, Бот. журн. 57, 9: 1040; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 118. — *Malcolmia intermedia* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 186. — *M. africana* auct. non (L.) W. T. Aiton: Вас. 1939, Фл. СССР, 8: 279. — *M. taraxacifolia* auct. non. (Balb.) DC.: Вас. 1939, цит. соч.: 283; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 228.

Описан из окр. Баку. Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «In campis et collibus prope Baku, 4 IV 1830, C. A. Meyer» (LE!).

ВК: В. Сулак.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.

Вост. Европа (оз. Эльтон); Сев., Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср. Азия.

Subtrib. 2. **Hesperidinae** Hayek

32 (244). **Hesperis** L.

Subgen. 1. **Hesperis**

1 (1242). **H. adzharica** Tzvel. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 144; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 87. — *H. matronalis* L. subsp. *adzharica* (Tzvel.) Cullen, 1965, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 26: 192; Cullen, 1965, Fl. Turk. 1: 456.

Описан из Аджарии. Турус: «Растения Закавказья 1914 г., Аджаро-Имеретинский хребет, Лекнара, 1 VIII 1914, Е. И. Кикодзе» (LE!).

ЗЗ: Гуап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ:** Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (1243). **H. ciscaucasica** F. Dvořák et V. I. Dorof. sp. nova; F. Dvořák ex V. I. Dorof. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 87, nom. nud. — Herba biennis vel perennis (?), ad 100 cm alt.; caules erecti, foliosi. Folia caulina inferiora longe petiolata, oblonga plus minusve dentata, superiora sessilia vel subsessilia, ovato-lanceolata vel oblongo lanceolata, margine dentata. Pilis epiphyllus simplicis plerumque, pilis hypophyllus bipartitis. Racemi ramosi; pedicellis glanduloso-pilosis subaequilonga; sepala appressa ad 6–7 mm lg, plus minusve pilosa; petala roseo-violacea, 16–17 mm lg, unguiculo calyce distincte longiore et limbo oblongo-obovato apice rotundato. Siliquae erecto-patentes, prope basin breviter pilosae, supra glabrae. V–VII. — Двулетние или многолетние (?) травянистые растения до 100 см выс. Стебель прямой, облиственный. Нижние стеблевые листья длинночерешковые; листовая пластинка продолговатая, более или менее зубчатая. Верхние листья сидячие или почти сидячие, округло-ланцетные или продолговато-ланцетные, с заметно расширенным основанием, по краю зубчатые; верхняя сторона опушена преимущественно простыми, нижняя — вильчатыми двураздельными волосками. Соцветия кистевидные. Цветоножки косо вверх направленные, опушены одинаковыми железистыми волосками, около 12 мм дл. Чашелистики прижатые, 6–7 мм дл., более или менее опушенные. Лепестки розовато-фиолетовые, 16–17 мм дл., с более длинными чем чашелистики ноготками до 10 мм дл. и продолговато-овальными, на верхушке