

Sect. 2. **Fedtschenkoa** (Regel) Botsch.

3 (1241). **S. intermedia** (C. A. Mey.) Botsch. 1972, Бот. журн. 57, 9: 1040; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 118. — *Malcolmia intermedia* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 186. — *M. africana* auct. non (L.) W. T. Aiton: Вас. 1939, Фл. СССР, 8: 279. — *M. taraxacifolia* auct. non. (Balb.) DC.: Вас. 1939, цит. соч.: 283; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 228.

Описан из окр. Баку. Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «In campis et collibus prope Baku, 4 IV 1830, C. A. Meyer» (LE!).

ВК: В. Сулак.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.

Вост. Европа (оз. Эльтон); Сев., Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср. Азия.

Subtrib. 2. **Hesperidinae** Hayek

32 (244). **Hesperis** L.

Subgen. 1. **Hesperis**

1 (1242). **H. adzharica** Tzvel. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 144; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 87. — *H. matronalis* L. subsp. *adzharica* (Tzvel.) Cullen, 1965, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 26: 192; Cullen, 1965, Fl. Turk. 1: 456.

Описан из Аджарии. Турпс: «Растения Закавказья 1914 г., Аджаро-Имеретинский хребет, Лекнара, 1 VIII 1914, Е. И. Кикодзе» (LE!).

ЗЗ: Гуап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ:** Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (1243). **H. ciscaucasica** F. Dvořák et V. I. Dorof. sp. nova; F. Dvořák ex V. I. Dorof. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 87, nom. nud. — Herba biennis vel perennis (?), ad 100 cm alt.; caules erecti, foliosi. Folia caulina inferiora longe petiolata, oblonga plus minusve dentata, superiora sessilia vel subsessilia, ovato-lanceolata vel oblongo lanceolata, margine dentata. Pilis epiphyllus simplicis plerumque, pilis hypophyllus bipartitis. Racemi ramosi; pedicellis glanduloso-pilosis subaequilonga; sepala appressa ad 6–7 mm lg, plus minusve pilosa; petala roseo-violacea, 16–17 mm lg, unguiculo calyce distincte longiore et limbo oblongo-obovato apice rotundato. Siliquae erecto-patentes, prope basin breviter pilosae, supra glabrae. V–VII. — Двулетние или многолетние (?) травянистые растения до 100 см выс. Стебель прямой, облиственный. Нижние стеблевые листья длинночерешковые; листовая пластинка продолговатая, более или менее зубчатая. Верхние листья сидячие или почти сидячие, округло-ланцетные или продолговато-ланцетные, с заметно расширенным основанием, по краю зубчатые; верхняя сторона опушена преимущественно простыми, нижняя — вильчатыми двураздельными волосками. Соцветия кистевидные. Цветоножки косо вверх направленные, опушены одинаковыми железистыми волосками, около 12 мм дл. Чашелистики прижатые, 6–7 мм дл., более или менее опушенные. Лепестки розовато-фиолетовые, 16–17 мм дл., с более длинными чем чашелистики ноготками до 10 мм дл. и продолговато-овальными, на верхушке

закругленными отгибами. Стручки вертикальные, слегка отклоненные, голые, в основании слегка опушенные короткими простыми волосками. V–VII.

Habitat in vallis fluminibus, in prati alpinibus et prati subalpinibus et in moreni Caucasi Magni. — Обитает по долинам рек, альпийским и субальпийским лугам и на моренах среднегорий и высокогорий Большого Кавказа.

Т у р u s: «Caucasus septentrionalis, Terskaja prov., prope pagum Edissii, in vallis flum. Kura, 15 VI 1906, № 551, Iv. Pokrovskij» (LE). — «Растения Северного Кавказа, долина р. Куры у с. Эдессии Терской области, 15 VI 1906, № 551, Ив. Покровский».

Affinitas. Haec species *H. sibiricae* L. proxima, sed foliis superioribus pilis hypophyllus bipartitis vestitis differt. Ab *H. matronali* L. pedicellis glanduloso-pilosis et foliis superioribus pilis hypophyllus bipartitis vestitis bene differt. — Хорошо отличается от *H. matronalis* L. наличием железистого опушения в верхней части растения, а от *H. sibirica* L. — густым опушением из вильчатых двураздельных волосков на нижней стороне стеблевых листьев.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Тер.

Эндемик.

3 (1244). **H. hirsutissima** (N. Busch) Tzvel. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 134. — *H. matronalis* L. var. *hirsutissima* N. Busch, 1910, Мат. фл. Кавк. 3, 4: 664.

Описан из Карабаха. Т у р u s: «Districtus Karabach, Westteile der Kaputschich, 16 VI [18]71, № 348, G. Radde» (LE!).

ЮЗ: Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Эндемик.

4 (1245). **H. matronalis** L. 1753, Sp. Pl.: 663; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 230; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 87. — *H. caucasica* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 91 (Fl. Cauc.).

Описан из Италии. Л е с т о т у р u s (Ball, 1993: 54): Herb. Clifford: 335, «*Hesperis* 2» (BM!).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах.; **Т:**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (европ. часть); Сев. (заносное), Юго-Зап., Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (заносное).

В **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Инг.-Рион. встречается неопушенная форма.

5 (1246). **H. pseudocinerea** V. I. Dorof. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 88. — *H. steveniana* DC. subsp. *cinerea* F. Dvořák, 1967, Spisy Přír. Fak. Univ. Brně, 485: 317, fig. 3. — *H. cinerea* F. Dvořák, 1966, Feddes Repert. 73, 2: 98, nom. nud., non Poir. 1813. — *H. steveniana* auct. non DC.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 232; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 89.

Описан из окр. Новороссийска. Т у р u s: «Окрестн. Новороссийска, 14-ый км по Сухумскому шоссе, близ филиала биолог. станции, в шиблике, 8 V 1938, № 34а, А. Ашрафья, Н. Буш» (LE).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Эндемик.

6 (1247). **Н. pycnotricha** Borbás et Degen, 1902, Magyar Bot. Lapok, 1: 269; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 88.

Описан из Европы. Ту р u s: «A. Callier, iter Tauricum tertium anni 1900, in locis apricis prope praedium Jeni-sala, 29 V, № 541, Halácsy» (LE!).

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т:**

Центр., Юго-Вост. (вост.), Вост. Европа; Сев. Азия (заносное).

7 (1248). **Н. sibirica** L. 1753, Sp. Pl.: 663; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 88. — *H. elata* Hornem. 1819, Suppl. Hort. Bot. Hafn.: 74. — *H. adenosepala* Borbás, 1902, Magyar Bot. Lapok, 1: 379. — *H. pontica* Zapal. 1912, Bull. Intern. Acad. Sci. Cracovie (Sci. Nat.), 12: 1158. — *H. sylvestris* auct. non Crantz: Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 245.

Описан из Сибири. Lectotypus (Ebel in Caffery, Jarvis, 2002: 533): Herb. Linn. 841.3 (LINN!).

ЗК: В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Галушко, 1980: 59).

Вост. Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия.

8 (1249). **Н. transcaucasica** Tzvel. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 130.

Описан из Армении. Ту р u s: «Армянская ССР, Мегринский р-н, редкий грабово-дубовый лес по склону к ущ. р. Вагравар-чай, выше пос. Вагравар, 1 VII 1956, № 1634, Т. В. Егорова и др., Н. Н. Цвелёв, С. К. Черепанов» (LE!).

ВЗ: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

9 (1250). **Н. voronovii** N. Busch, 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 358; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 247; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 232; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 89. — *H. matronalis* L. var. *meyeriana* Trautv. 1878, Тр. Петерб. бот. сада, 5, 2: 408. — *H. meyeriana* (Trautv.) N. Busch, 1939, Фл. СССР, 8: 246. — *H. matronalis* subsp. *voronovii* (N. Busch) P. W. Ball, 1963, Feddes Repert. 68: 194. — *H. armena* auct. non Boiss.: Н. Буш, 1910, Мат. фл. Кавк. 3, 4: 654. — *H. sylvestris* auct. non Crantz: Н. Буш, 1939, цит. соч.: 245.

Описан с Западного Кавказа. Ту р u s: «Растения Черкесии, карстовая область г. Фишт, истоки р. Белой, 4 IX 1927, G. Woronow et W. Steup» (LE!).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 59).

Юго-Зап. Азия (Турция).

Subgen. 2. **Mediterranea** Borbás

10 (1251). **H. persica** Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 64; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 233. — *H. karsiana* N. Busch, 1935, Бот. журн. СССР, 20, 1: 85. Описан из северного Ирана («№ 4103, Aderbijan»).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.; **Т:** Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

33 (245). **Clausia** Korn.-Trotzky

1 (1252). **C. aprica** (Stephan) Korn.-Trotzky, 1834, Delect. Sem. Horti Cazan.: sine pag.; Вас. 1939, Фл. СССР, 8: 252; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 251; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 61. — *Cheiranthus apricus* Stephan, 1800, in Willd. Sp. Pl. 3, 1: 518. — *Hesperis cretacea* Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 62; Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 172. — *H. aprica* (Stephan) Poir. 1813, Encycl. Méth. Bot. Suppl. 3: 194.

Описан из Сибири («in Sibiria ulteriori»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In apricis montium Uralensium et Sibir. australioris, Pallas» (LE!).

ЦК: В. Кум., Малк.

Юго-Вост. (вост.), Вост. Европа (центр, юг); Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

Subtrib. 3. **Erysiminae** Prantl

34 (246). **Erysimum** L.

Sect. 1. **Cheiropsis** (C. A. Mey.) Ledeb.

1 (1253). **E. babadagense** Prima, 1973, Новости сист. высш. раст. 10: 156; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 78.

Описан из Азербайджана. *Typus*: «Вост. Кавказ, Азербайджан, верх. р. Вель-величай (в 5–6 км от вершины горы Бабадаг), на сланц. осыпях, 3200 м над ур. м., 19 VII 1971, цв. и пл., В. Прима» (LE!).

ВК: В. Сулак.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.

Эндемик.

2 (1254). **E. anceps** Steven ex Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 187. — *Erysimastrum anceps* (Steven ex Ledeb.) Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 83 (Fl. Cauc.).

Описан с Восточного Кавказа. *Lectotypus* (Polatschek, 2010: 257): «E Caucaso orientali, inter Buduk et Chinalug [Khynalyk], 1919, Steven» (H).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.

Эндемик.

3 (1255). **E. argyrocarpum** N. Busch, 1939, Фл. СССР, 8: 638, 108; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 240.