

Описан с Волги. *Lectotypus* (Anchev, Polatschek, 2006: 258): «Ad Wolgam lectus» (LE!).

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ВК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.
Юго-Вост. (вост.), Вост. (центр, юг) Европа; Сев., Ср. Азия.

3 (1295). **S. siliculosa** (Bieb.) Andr. ex C. A. Mey. 1831, in Ledeb. Fl. Alt. 3: 162; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 119. — *Cheiranthus siliculosus* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 121. — *Erysimum siliculosum* (Bieb.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 491.

Описан из Прикумских степей. *Lectotypus* (Дорофеев, 2002: 109): «Ex deserto Cumanico et Caucaso demissiore» (LE!); *syntypus*: «Desertum Cumanum» (LE!).

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр. (Гроссгейм, 1950: 246).

Юго-Вост. (вост.), Вост. (Причерноморье, юго-вост.) Европа; Сев. (Зап. Сибирь), Ср. Азия.

Subtrib. 4. **Alyssinae** Sond.

37 (249). **Fibigia** Medik.

1 (1296). **F. clypeata** (L.) Medik. 1792, Pfl.-Gatt.: 91; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 210; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 85. — *Alyssum clypeatum* L. 1753, Sp. Pl.: 651.

Описан из Южной Европы. *Lectotypus* (Phitos in Strid, Kit Tan, 2002: 224): Herb. Burser XI: 29 (UPS-BURSER).

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан.

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 210).

Южн., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Ирак, Иран).

2 (1297). **F. eriocarpa** (DC.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 258; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 211; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 85. — *Farsetia eriocarpa* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 288.

Описан с Кипра. *Typus*: «Cyprus, Labillardiere» (G?).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (юг Таманского п-ова) (Галушко, 1980: 53).

Средиз. (Италия, Греция); Юго-Зап. Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Израиль); Сев. Африка (Египет).

3 (1298). **F. macrocarpa** (Boiss.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 258. — *Farsetia macrocarpa* Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 89.

Описан из Турции. *Typus*: «Prov. Malatya: Ak Dag, № 236, Auch.» (K?).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан, Ирак, Иран).

4 (1299). **F. macroptera** (Kotschy et Boiss. ex E. Fourn.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 257; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 211. — *Farsetia macroptera* Kotschy et Boiss. ex E. Fourn. 1864, Bull. Soc. Bot. Fr. 11: 60.

Описан из Турции («Crescit in valle Goschkur, frequens inter saxa, in montibus 5600 ped. altis, angusto fructifera»).

ЮЗ: Нах.

Указан для **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Гроссгейм, 1950: 211).

Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

38 (250). **Brachypus** Ledeb.

1 (1300). **B. suffruticosus** (Vent.) V. I. Dorof. comb. nova. — *Lunaria suffruticosa* Vent. 1800, Descr. Pl. Nouv.: 19 et tab. — *Fibigia suffruticosa* (Vent.) Sweet, 1826, Hort. Brit.: 467; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 211. — *Brachypus asper* Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 133.

Описан по культивированным в Ботаническом саду Цельса (J. M. Cels) в Париже образцам, происходящим из Юго-Западной Азии («sur la route d'Hamadam à Casbin»). Ту р u s: [Icon] E. P. Ventenat, 1800, Descr. Pl. Nouv.: tab. 19.

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Нах.

Юго-Зап. (Ирак, Иран), Ср. (Копетдаг) Азия.

39 (251). **Alyssoides** Mill.

1 (1301). **A. utriculata** (L.) Medik. 1789, Philos. Bot. 1: 189; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 34. — *Alyssum utriculatum* L. 1767, Mantissa Pl.: 92. — *Vesicaria utriculata* (L.) Lam. 1805, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, 4: 696. — *V. reticulata* Lam. 1808, Encycl. Méth. Bot. 8: 572. — *V. graeca* Reut. 1855, in Boiss. Cat. Hort. Genev. 4: 261, fig. 14; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 208. — *Lagowskia physocarpa* Trautv. 1858, Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. (Petersb), 16: 322. — *Alyssoides graeca* (Reut.) Jáv. 1923, Bot. Kösl. 21: 73.

Описан с «Востока» («in Oriente»). Л е с т о т у р u s (Al Shehbaz, Turland in Calferty, Jarvis, 2002: 531): Herb. Linn. 828.22 (LINN).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.

Южн., Юго-Вост. (зап.) Европа; Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (Турция).

40 (252). **Asperuginoides** Rauschert

1 (1302). **A. axillaris** (Boiss. et Hohen.) Rauschert, 1982, Taxon, 31, 3: 558. — *Buchingera axillaris* Boiss. et Hohen. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 1, 8: 29; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 368; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 222.

Описан из Ирана. Isotypus: «Th. Kotschy. Pl. Pers. bor. Ad versuras agrorum prope urbem Teheran, D. 15 IV 1843, №10» (LE!).

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср. Азия.